

Encinares

La encina (*Quercus ilex*) es una de las especies características de la región Mediterránea, extendiéndose su distribución desde la Península Ibérica hasta Turquía. Es capaz de soportar fuertes sequías, grandes contrastes térmicos y una gran variedad de sustratos. Además de ser la especie principal de los encinares, la encina es protagonista de la mayor parte de las dehesas del territorio español, segunda formación forestal más extensa del país.



Las dehesas son sistemas agrosilvopastorales originales del mediterráneo que se distribuyen generalmente por la mitad occidental peninsular.

SUPERFICIE TOTAL 2.794.450 ha

Castilla La Mancha	703.122 ha (25,16 %)
Andalucía	583.214 ha (20,87 %)
Castilla y León	424.537 ha (15,19 %)
Extremadura	398.696 ha (14,27 %)
Aragón	226.350 ha (8,10 %)
Cataluña	197.046 ha (7,05 %)
Madrid	80.274 ha (2,87 %)
C. Valenciana	63.413 ha (2,27 %)
Navarra	33.429 ha (1,20 %)
País Vasco	23.581 ha (0,84 %)
La Rioja	19.515 ha (0,70 %)
Cantabria	15.102 ha (0,54 %)
Islas Baleares	13.165 ha (0,47 %)
Murcia	5.573 ha (0,20 %)
Asturias	4.654 ha (0,17 %)
Galicia	2.780 ha (0,10 %)

- 15,28 % de la superficie de bosque nacional
- 98,05 % de su superficie tiene origen natural o de repoblaciones claramente integradas
- Además del encinar, las dehesas de encina ocupan 2.163.058 ha, representando un 11,82 % de la superficie forestal nacional.


Los encinares son la formación forestal con mayor extensión en superficie a nivel nacional.

Los encinares en cifras

Número de árboles (pies mayores)	Regeneración (número de pies menores)	Volumen con corteza (m ³)	Incremento anual (m ³ /año)	Altura dominante (m)
• 424,3	• 1,173,6	• 18,5	• 0,5	• 6,9


*Datos promedios por hectárea

Distribución diamétrica de *Quercus ilex*




Riqueza de especies

Porcentaje de superficie de la formación



Presencia de las principales especies acompañantes



Más de la mitad (51,87%) de los encinares presentan al menos una especie acompañante. En casi un 56% de su superficie ésta es una frondosa, apareciendo en más de un 20% de sus masas el quejigo (*Quercus faginea*) como segunda especie en importancia. Entre las coníferas, el enebro de la miera (*Juniperus oxycedrus*) es la más frecuente, mientras que un 18% de los encinares aparecen acompañados por algún pino.

La encina domina en el estrato arbóreo pero tiene un rico estrato de matorral con una composición de especies muy variable a lo largo de su geografía peninsular.