

Agrodiaetus violetae Gómez Bustillo, Expósito y Martínez, 1979

Superfamilia: *Lycaenoidea*

Familia: *Lycaenidae*

Subfamilia: *Polyommatae*

Tribu: *Polyommataini*

Género: *Agrodiaetus* Hubner, 1822

Status: Vulnerable.

Planta nutricia: Desconocida, aunque es muy probable que viva como larva sobre *Medicago spp.*, *Onobrychis spp.* y otras leguminosas herbáceas.

Distribución: Endemismo, conocido exclusivamente de la vertiente malagueña de la Sierra de Almirajara, Sistema Penibético, de un lugar cercano al Arroyo Ciquilias, en el término municipal de Canillas de Albaida.

Hábitat: Zona de umbría, de patente humedad, con filtraciones a terrenos circundantes que sirven de «bebedero» a Licénidos y Hespéridos.

Ciclo biológico: Se desconocen sus estados inmaduros, pero debe invernar como oruga y continuar su desarrollo en la primavera, probablemente asociada con hormigas, como sus congéneres, entrando en actividad imaginaria en una sola generación durante agosto.

Recomendaciones: Dado el aislamiento y poca densidad de sus colonias conocidas y al estar su área de vuelo atravesada por una carretera bastante concurrida, puede pasar en cualquier momento a especie en extinción, y por ello sería muy aconsejable la creación de un área de reserva que ampare la localidad donde ha sido capturada y amplios espacios circundantes donde es probable que aparezcan otras colonias, debiendo vigilarse cuidadosamente la zona, que ha sufrido importantes daños por incendios forestales.