

Borbo zelleri (Lederer, 1855)

Superfamilia: *Hesperioidea*

Familia: *Hesperiidae*

Subfamilia: *Hesperiinae*

Tribu: *Hesperiini*

Género: *Borbo* Evans, 1949

Status: En peligro de extinción (antes, Vulnerable).

Planta nutricia: Gramíneas herbáceas, y entre ellas arroz (*Oryza sativa*).

Distribución: Han sido clásicas sus citas de Algeciras, La Línea de la Concepción y Gibraltar, correspondientes a la subespecie *holii* del Norte de Africa; y en la década de los 70 de Amposta (Tarragona), en los arrozales de la desembocadura del Ebro, colonia separada como subespecie diferente: *tarraconensis*. No ha vuelto a capturarse en esta última localidad desde entonces, pudiendo considerarse prácticamente extinguida, no así la subespecie establecida en Cádiz, que sigue observándose en vuelo año tras año, cuidadosamente protegida por los aficionados de la zona. Una cita correspondiente a 1974, del Valle de Llorca (Gerona), debe tenerse en cuenta, sujeta a confirmación.

Hábitat: Prefiere las zonas de monte bajo, pudiendo adaptarse perfectamente a las marismas y biotopos de gran humedad.

Ciclo biológico: Tiene dos generaciones, la primera en junio y la siguiente en septiembre/octubre, pero se conoce muy poco de sus requerimientos ecológicos en la Península Ibérica.

Recomendaciones: Estudio cuidadoso de la costa mediterránea, y protección absoluta de las colonias gaditanas.