

Zygaena (Agrumenia) carniolica (Scopoli, 1763)

Superfamilia: *Zygaenoidea*

Familia: *Zygaenidae*

Subfamilia: *Zygaeninae*

Tribu: *Zygaenini*

Género: *Zygaena* Fabricius, 1775

Subgénero: *Agrumenia* Hubner, 1819

Status: Rara.

Planta nutricia: Vive, en España, sobre *Onobrychis* sp. Naumann, *in litt.*, 1985),

estando citada de otros países sobre *Anthyllis montana*, *Dorycnium suffruticosa*, *Hedysarum* spp., *Astragalus* spp., *Lotus* spp. y otras leguminosas.

Distribución: Aunque en la región Paleártica sea especie corriente y en algunas localidades mediterráneo-orientales constituya verdadera plaga con cientos de miles de individuos, en España es una especie muy localizada y rara, conociéndose sólo de los Pirineos de Huesca, Lérida y Gerona, de los Montes Universales y de Sierra Nevada. Se han separado tres subespecies: *albarracina* (Cuenca y Teruel), *sagarraina* (Pirineo de Huesca y catalanes) y *albicans* (Sierra Nevada).

Hábitat: Muestra preferencia por zonas protegidas del viento entre los 1.000 y los 1.600 metros de altitud.

Ciclo biológico: Vuela. durante el día, en julio y parte de agosto, inverna como oruga y crisalidando dentro de un capullo sobre su planta nutricia, y se trata de un taxón muy variable, lo mismo como larva que como adulto.

Recomendaciones: Seguir el curso de su distribución geográfica, confirmándose que por el momento se ha ampliado su área de vuelo en los Montes Universales.