

Avión Común *Delichon urbica*

Catalán Oreneta cuablanca
Gallego Andoriña de cu branco
Vasco Enara azpizuria




DISTRIBUCIÓN

Mundial. Amplísima área de cría por toda Eurasia, desde el círculo polar hasta el norte de África (Voous, 1960). Se extiende por Asia Menor, Mongolia y Manchuria (Glutz & Bauer, 1985; Cramp, 1988). En Europa ha sido separada hasta en tres subespecies (Clancey, 1950), aunque con toda posibilidad es una sola, la nominal (De Lope, 1986) que cría por el oeste de Asia, desde los 71° N en Escandinavia y 62° N en Siberia por el este del Yenisei, Mongolia central y oeste del Himalaya hasta el norte de África,

Asia menor y NO de la India. Ha criado en Israel, Islandia, islas Faroes y es esporádica en Malta. Ha llegado a criar en los cuarteles invernales africanos en Namibia (Turner & Rose, 1989). La población europea se estima en 9.500.000-31.000.000 pp. (BirdLife International/EBCC, 2000).

España. Cría por toda la superficie peninsular, Ceuta, Melilla y archipiélago Balear, pero no se reproduce en Canarias. Tradicionalmente aprovecha las construcciones humanas para instalar sus nidos, aunque se le puede encontrar en puentes, presas y roquedos, siendo posiblemente estos últimos su hábitat ancestral.




Cobertura	%	R. posible	%	R. probable	%	R. segura	%	Información 1985-1997	Información 1998-2002
4.677	83,5	518	11,1	315	6,7	3.844	82,2	1.033	3.644



Llega a formar colonias numerosísimas en los aleros de los edificios, su lugar de cría más frecuente, como lo demuestra su apelativo específico. En muchas zonas de nuestra geografía peninsular es el hirundínido más abundante, sobre todo en Extremadura y el vecino Alentejo portugués. Un tanto impredecible en su hábitat alimenticio, ya que es muy dependiente de las condiciones climáticas, fundamentalmente del viento. Cría prácticamente en todos los biomas, desde el nivel del mar hasta los 2.500 m en sierras. Se desconoce su área de invernada aunque existen fundamentos para situarla en la costa occidental africana del golfo de Guinea, donde se han visto agrupaciones de hasta 50.000 individuos (obs. pers.).

POBLACIÓN Y TENDENCIA EN ESPAÑA

Los efectivos españoles se han calculado previamente en 1.140.000-2.160.000 pp. reproductoras (Purroy, 1997). En España, sus mayores abundancias se registran en pueblos, y la media de sus densidades máximas citadas en este hábitat es de 13,33 aves/10 ha. No parece que la población ibérica haya sufrido un descenso en el número de nidificantes y los datos preliminares



1-9 pp.	10-99 pp.	100-999 pp.	1.000-9.999 pp.	>9.999 pp.	Sin cuantificar
252	1.916	1.510	150	0	849



del Programa SACRE reflejan, en el periodo 1996-2000 una tendencia ligeramente positiva aunque con claras variaciones interanuales (SEO/BirdLife, 2001e), debido probablemente a las fluctuaciones climáticas en sus cuarteles de invernada.

CONSERVACIÓN Y AMENAZAS

No presenta de momento problemas de conservación. Los enemigos naturales son la Lechuza Común y la Urraca que extraen a los pollos de los nidos. En algunos países como Portugal se han instalado nidos artificiales con éxito relativo. En muchas ocasiones sus nidos son destruidos alegando cuestiones higiénicas y molestias, aunque parece ser que esta cuestión ha remitido bastante en los últimos años.

Florentino de Lope