


Bisbita Arbóreo *Anthus trivialis*

Catalán Piula dels arbres
Gallego Pica das árbores
Vasco Uda txirta




DISTRIBUCIÓN

Mundial. Nidificante en la mayor parte de Europa, excepto Irlanda, que ocupa también una extensa zona de Asia hasta el este del lago Baikal, y el norte de Anatolia e Irán. Inverna en el África subsahariana en ambientes de sabana arbolada y bordes de cultivos. Su población en Europa se estima en 21.000.000-32.000.000 pp. reproductoras (BirdLife International/EBCC, 2000).

España. Estival, de distribución sólo peninsular, predominantemente eurosiberiana y, también, en bosques abiertos del piso

supramediterráneo. El mapa de distribución refleja un similar panorama que el datado en 1975-1995 (Purroy, 1997), con ocupación continua del tercio norte de la Península, desde Galicia a Cataluña, y avanzadilla meridional en puntos de los sistemas Ibérico y Central. La colonización del Sistema Central se inició en la década de 1970 por la sierra de Ayllón, con ejemplares probablemente procedentes de la nutrida población del Sistema Ibérico septentrional (De Juana, 1980; Díaz *et al.*, 1994), con posterior entrada hasta Gredos y la sierra de Béjar (Carnero & Peris, 1988). En la cuenca del Duero baja a las tierras llanas a favor de



Cobertura	%	R. posible	%	R. probable	%	R. segura	%	Información 1985-1997	Información 1998-2002
1.274	22,8	96	7,5	849	66,6	329	25,8	384	890

las riberas, más en la margen derecha más fresca, que en la izquierda. Ascende hasta los 1.700 m de altitud en la cordillera Cantábrica y la sierra de La Demanda. Prefiere los paisajes con pastizales y matorrales que conservan árboles dispersos, y los bosques poco densos con subvuelo abierto (Purroy, 1997). Común en los montes aclarados de roble melojo.


POBLACIÓN Y TENDENCIA EN ESPAÑA

Población española estimada entre 300.000 y 400.000 pp. reproductoras (Purroy, 1997). Más de 10.000 pp. nidificantes en Burgos (Román *et al.*, 1996) y el mismo rango de abundancia en Palencia (Jubete, 1997). En España, sus mayores abundancias se registran en brezales, pinares de pino silvestre y robledales, y la media de sus densidades máximas citadas en esos tres hábitats es de 2,91 aves/10 ha. No se dispone de información sobre posibles tendencias.

AMENAZAS Y CONSERVACIÓN

No se conocen problemas específicos en España.

Francisco J. Purroy



1-9 pp.	10-99 pp.	100-999 pp.	1.000-9.999 pp.	>9.999 pp.	Sin cuantificar
143	645	343	10	0	133

