



## *Dendrocopos major canariensis* Koenig, 1889

Castellano: Pico picapinos de Tenerife

### CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: VULNERABLE

ENDEMISMO ESPAÑOL

### DISTRIBUCION

Subespecie endémica de la Isla de Tenerife (Canarias).

### HABITAT

Este taxón ocupa exclusivamente los pinares viejos de *Pinus canariensis* entre los 800 y 1.800 m. de altitud, principalmente en zonas con sotobosque de escobones (*Chamaecytisus proliferus*) y codesos (*Adenocarpus foliolosus*).

### POBLACION

Aunque no se ha llevado a cabo ningún estudio exhaustivo para conocer la distribución y densidad poblacional de este pícido, se estima que su población no debe superar el centenar de parejas (1). La mayor parte de ellas se concentra en los pinares de la vertiente sur de la isla.

### AMENAZAS

La destrucción intensiva de los pinares en el pasado ha condicionado su distribución fragmentada (fragmentaria/dispersa) y pese a que buena parte de las zonas potenciales de pinar han sido repobladas a partir de los años cincuenta, no parecen constituir aún un hábitat adecuado. La caza y las colectas con fines científicos parecen haber sido importantes y quizás expliquen su desaparición de los pinares de Aguamansa-Santa Ursula (2)

### MEDIDAS DE PROTECCION

Evitar nuevas talas forestales en áreas donde esta subespecie está presente, la apertura de nuevas pistas y la retirada de los pinos muertos. Convendría iniciar estudios para esclarecer las causas por las que este pícido resulta tan escaso.

### REFERENCIAS

1. Martín, A. (1987) : Atlas de las aves nidificantes en la isla de Tenerife instituto de Estudios Canarios. Monografía XXXII. La Laguna.
2. E. Hernandez: Comunicación personal, mayo de 1992.