





51 MATORRALES SUBMEDITERRÁNEOS Y DE ZONA TEMPLADA


5110 Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas (*Berberidion p.p.*)

Matorrales de boj que resultan de la sustitución de distintos tipos de bosque, pudiendo actuar como vegetación permanente en laderas abruptas, crestas y espolones.

 Las **bojedas**¹ son formaciones que se distribuyen fundamentalmente por el cuadrante nororiental de la Península, pero que se extienden por las sierras mediterráneas de la mitad oriental ibérica hasta las béticas, con unas pocas localidades en la Cordillera Cantábrica. El boj balear (*Buxus balearica*) forma bojedas en las sierras prelitorales de Andalucía oriental y de las islas Baleares.

 El boj (*Buxus sempervirens*) forma matorrales en la media montaña ibérica (400-1700 m) que crecen en suelos calcáreos y que pueden actuar como matorrales de **sustitución de bosques climácicos**² (hayedos xero-termófilos, robleales pubescentes, quejigares, pinares albares o salgareños, etc.) o constituir comunidades permanentes en suelos


esqueléticos, roquedos, pendientes abruptas, espolones, etc.

 La bojeda es un matorral en el que el boj forma masas densas acompañado en menor proporción por algunas especies características de las orlas forestales. En las montañas levantinas y catalanas y en los Pirineos la bojeda es más bien pobre, con especies como *Amelanchier ovalis*, *Berberis vulgaris*, *Lonicera peryclimum*, especies de *Rosa*, etc. En la Cordillera Cantábrica son frecuentes, junto al boj, arbustos como *Prunus spinosa*, *Ligustrum vulgare* o *Crataegus monogyna*, entre otros. En las montañas béticas la comunidad se enriquece en elementos meridionales o endémicos, alcanzando la máxima diversidad, con taxones como *Berberis vul-*



Boj (*Buxus sempervirens*)

garis subsp. australis, *Cotoneaster granatensis*, *Crataegus lacinata*, *Lonicera arborea*, *Lonicera splendida*, *Ononis reuteri*, *Prunus ramburii*, etc. El boj balear (*Buxus balearica*) vive en sierras prelitorales atemperadas por la influencia del Mediterráneo, ocupando escarpes y laderas pedregosas, donde convive con algunas especies de las garrigas.

 La fauna de las bojedas es semejante a la de otros matorrales con los que contacta.

CÓDIGOS DEL ATLAS DE HÁBITAT

411010; 411020; 411030; 411040;
411050; 411060

