



Foto: Jaime Güemes


Antirrhinum valentinum

Endemismo de la provincia de Valencia, limitado a las Sierras de Corbera, Buixarró, Mondúber y sus estribaciones. Se tienen datos del número de individuos de siete poblaciones, una de ellas artificial por la introducción de veinte ejemplares. La especie presenta, en todas sus poblaciones, presiones por desprendimiento de rocas, sequías e incendios. Algunas poblaciones presentan, además, amenazas de origen antrópico como el pisoteo, la artificialización y la ejecución de obras de acondicionamiento.

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN FUTURA



Evolución prevista

La especie presenta, en todas sus poblaciones, presiones de origen biótico y catastrófico, fundamentalmente debidas a la escasa plasticidad ecológica, los desprendimientos de rocas, las sequías y los incendios. Se prevé su extinción futura a menos que se aprovechen nuevas zonas potenciales muy alejadas de las actuales lo cual exige un plan de conservación ex situ previo.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 568 (8%)
- área potencial: 7072

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	787 (11%)	5136 (73%)	5%	53%
• 2041-2070	1482 (21%)	2136 (30%)	14%	20%
• 2071-2100	193 (3%)	242 (3%)	1%	0%
ECHAM4				
• 2011-2040	2341 (33%)	74 (1%)	24%	1%
• 2041-2070	322 (5%)	79 (1%)	2%	0%
• 2071-2100	35 (1%)	0 (0%)	0%	0%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.