



Foto: P. Navas

## Armeria colorata

Edafoendemismo exclusivo de las sierras peridotíticas de Andalucía (provincia de Málaga), sector Bermejense (provincia Bética). Aparece en las zonas más abruptas de las sierras mencionadas en grietas, repisas, rellanos de roquedos y en claros del matorral sobre litosuelos. Se han observado pocos individuos juveniles y plántulas, siendo lo más frecuente individuos con numerosas rosetas. Las poblaciones se encuentran muy deterioradas fundamentalmente por fuego y pérdidas de flores por predación. La superficie de ocupación real es inferior a 2.75 km<sup>2</sup>.

### SITUACIÓN FUTURA

CGCM2 ■  
 ECHAM4 ■  
 CGCM2 y ECHAM4 ■

### SITUACIÓN ACTUAL



### Evolución prevista

Actualmente las poblaciones muy fragmentadas y aisladas soportando una fuerte presión de herbívoros y un exceso de visitas y recolecciones. Se prevé la desaparición de su zona actual y la aparición de zonas potenciales muy alejadas, única vía para su posible conservación.

### ESTADÍSTICA

#### Superficies actuales (km<sup>2</sup>)

- presencia: 21 (3%)
- área potencial: 654

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
• 2011-2040	427 (65%)	1061 (162%)	81%	0%
• 2041-2070	1613 (247%)	1303 (199%)	24%	0%
• 2071-2100	519 (79%)	3835 (586%)	0%	0%
<b>ECHAM4</b>				
• 2011-2040	24 (4%)	0 (0%)	5%	0%
• 2041-2070	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
• 2071-2100	6 (1%)	38 (6%)	5%	0%

### VULNERABILIDAD



A2



2011-2040

B2



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

*Ex situ:*

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

**Planificación y coordinación.**

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.