



© RICARDO G. CALMAESTRA

Bucanetes githagineus

Bucanetes githagineus (Camachuelo trompetero). En la Europa continental únicamente está presente en el sureste de la Península Ibérica (Almería, Granada, Murcia y Alicante), así como en una pequeña área de Turquía. Es una especie característica de terrenos áridos, con terrenos accidentados, suelos poco desarrollados y vegetación muy escasa. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre 1,1°C y 33,4°C, y el de precipitaciones entre 216 mm y 361 mm anuales.


(Camachuelo trompetero)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN FUTURA



TSS: 0,9617

ECHAM4
CGCM2
CGCM2 Y ECHAM4

Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 563% y un 777% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango un 100% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)


Presencia:	2200 (0%)	% Protegido actualmente:	(0%)
Área potencial:	24800	% Protegido futuro:	(0%)

APF


OPF

CGCM2	A2		B2	
	2011-2040	2041-2070	2011-2040	2041-2070
CGCM2	57700 (133%)	83800 (238%)	89600 (261%)	73900 (198%)
ECHAM4	115900 (367%)	174600 (604%)	73300 (196%)	164400 (563%)
ECHAM4	155800 (528%)	217600 (777%)	144600 (483%)	198800 (702%)


A2




B2





2011-2040



2041-2070



2071-2100



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- No se requieren medidas de adaptación.