




Foto: Lycaon (Wikimedia Commons)


Chamaerops humilis

El palmito, única palmera autóctona europea, se distribuye exclusivamente en el litoral mediterráneo con algunos enclaves en el interior de Andalucía. Se presenta como un matorral abierto en zonas cálidas y soleadas, siempre por debajo de los 1000 m y más frecuentemente entre 0 y 300 m con pendientes bajas e insolaciones altas.

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN FUTURA



Evolución prevista

El palmito puede verse favorecido en los dos primeros periodos debido al crecimiento de su área potencial. Esta expansión se vería reducida en el periodo 2070-2100 siempre en función del área ocupada actual. Un plan específico de expansión y regeneración permitiría abordar este último periodo con más garantías al haber aumentado el área de ocupación real. En cualquier caso, los modelos prevén su desaparición de los enclaves más occidentales de Andalucía.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 2989 (11%)
- área potencial: 26226

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	39981 (152%)	60058 (229%)	66%	70%
• 2041-2070	23006 (88%)	38231 (150%)	38%	52%
• 2071-2100	3385 (13%)	11500 (44%)	5%	17%
ECHAM4				
• 2011-2040	7389 (28%)	2635 (10%)	6%	2%
• 2041-2070	679 (3%)	1549 (6%)	1%	1%
• 2071-2100	20 (0.1%)	15 (0.1%)	0%	0%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

1. Protección de espacios actuales.
2. Mejora del estado de comunidades actuales.
3. Restauración de zonas potenciales futuras.

Generales:

4. Plan de gestión específico.

Los palmitares precisan un plan específico para una protección global y para facilitar su regeneración y expansión previendo problemas en el último periodo del siglo.