




© SARA VARELA

Ciconia ciconia

Ciconia ciconia (Cigüeña blanca). Ampliamente distribuida por el centro y sur de Europa. Ocupa fundamentalmente la mitad occidental de la Península Ibérica, aunque también está presente en la oriental siguiendo el valle del Ebro. De marcado carácter antrópico, ocupa gran variedad de ambientes, incluyendo medios urbanos, pastizales, dehesas y humedales. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -5,6°C y 36,6°C, y el de precipitaciones entre 317 mm y 1663 mm anuales.

SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,4190

SITUACIÓN FUTURA



Evolución Prevista:


Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos moderados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 25% y un 31% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 37% y un 48% en 2041-2070.

(Cigüeña blanca)


ESTATUS ACTUAL

LC



A2





B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	198700 (39%)	% Protegido actualmente:	(26%)
Área potencial:	305100	% Protegido futuro:	(13%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
2011-2040	239400 (-22%)	200400 (-34%)	(65%)	(59%)
2041-2070	263900 (-14%)	240100 (-21%)	(70%)	(63%)
2071-2100	237000 (-22%)	216700 (-29%)	(61%)	(60%)
ECHAM4				
2011-2040	195900 (-36%)	201100 (-34%)	(40%)	(42%)
2041-2070	210300 (-31%)	228900 (-25%)	(37%)	(48%)
2071-2100	230700 (-24%)	231400 (-24%)	(38%)	(44%)

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.