

Circus cyaneus

(Aguilucho pálido)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA




© ÁNGEL GÓMEZ

Circus cyaneus (Aguilucho pálido). Presente en toda Europa. En la Península Ibérica se distribuye principalmente por el cuadrante noroccidental, ocupando áreas abiertas con pastos, matorral y cultivos cerealistas. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -6,9°C y 36,3°C, y el de precipitaciones entre 256 mm y 1852 mm anuales.

SITUACIÓN ACTUAL

SITUACIÓN FUTURA



PRESENCIA
ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,3666

ECHAM4
CGCM2
CGCM2 Y ECHAM4

Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos elevados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 78% y un 83% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 12% y un 15% en 2041-2070.


ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia: 157900 (31%) % Protegido actualmente: (21%)
Área potencial: 306300 % Protegido futuro: (3%)

APF OPF

CGCM2	A2		B2	
	APF	OPF	APF	OPF
2011-2040	306500 (0%)	308400 (1%)	(78%)	(77%)
2041-2070	185700 (-39%)	246700 (-19%)	(49%)	(64%)
2071-2100	116100 (-62%)	203100 (-34%)	(31%)	(53%)
ECHAM4				
2011-2040	137200 (-55%)	113100 (-63%)	(33%)	(26%)
2041-2070	50800 (-83%)	68300 (-78%)	(12%)	(15%)
2071-2100	18300 (-94%)	29300 (-90%)	(3%)	(6%)



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Medidas para conservación ex situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.