

20
25



RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES

RED DE NIVEL II MEMORIA – 2025

PARCELA 10 Ppa (HUELVA)




DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES
Y DESERTIFICACIÓN

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y
LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN
ÁREA DE INVENTARIO Y ESTADÍSTICAS FORESTALES



Cofinanciado por
la Unión Europea



Tecmena, s.l.
TECNICAS DEL MEDIO NATURAL

Clara del Rey, 22
28002 Madrid
Tel. 91 413 70 07
Fax. 91 510 20 57
correo@tecmena.com

Índice

1. Situación de la parcela	1
2. Caracterización de la parcela	2
2.1. Climatología	2
2.2. Geología y suelos	2
2.3. Vegetación	4
2.4. Caracterización forestal y dasométrica	4
3. Estado fitosanitario de la parcela	5
3.1. Defoliación y decoloración	5
3.2. Daños forestales	7
4. Instrumentación	15
5. Deposición atmosférica	16
5.1. pH	18
5.2. Conductividad	19
5.3. Potasio	21
5.4. Calcio	22
5.5. Magnesio	24
5.6. Sodio	25
5.7. Amonio	26
5.8. Cloro	28
5.9. Nitratos	29
5.10. Sulfatos	30
5.11. Alcalinidad.....	32
5.12. Nitrógeno total	33
5.13. Carbono orgánico disuelto.....	34
5.14. Aluminio	35
5.15. Manganeseo.....	36
5.16. Hierro.....	37
5.17. Interpretación de resultados	38
6. Calidad del aire. Inmisión	40
7. Análisis foliar	42
7.1. Macronutrientes	42
7.2. Micronutrientes	44
7.3. Interpretación de resultados	45
8. Desfronde	46
9. Fenología	49
10. Cintas diamétricas	52
11. Meteorología	53
12. Índice de Área Foliar	55

INDICE DE TABLAS

- TABLA 1:** Características de la parcela.
TABLA 2: Datos meteorológicos parcela.
TABLA 3: Inventario florístico 2007-2009
TABLA 4: Características dasométricas
TABLA 5: Distribución de agentes dañinos en la parcela
TABLA 6: Distribución de síntomas y signos en la parcela
TABLA 7: Relación entre agentes, síntomas y signos observados
TABLA 8: Equipos de medición instalados
TABLA 9: Parámetros descriptores de la deposición atmosférica
TABLA 10: Caracterización pH
TABLA 11: Caracterización conductividad
TABLA 12: Caracterización potasio
TABLA 13: Caracterización calcio
TABLA 14: Caracterización magnesio

TABLA 15:	Caracterización sodio
TABLA 16:	Caracterización amonio
TABLA 17:	Caracterización cloro
TABLA 18:	Caracterización nitratos
TABLA 19:	Caracterización sulfatos
TABLA 20:	Caracterización alcalinidad
TABLA 21:	Caracterización nitrógeno total
TABLA 22:	Caracterización carbono orgánico disuelto
TABLA 23:	Caracterización aluminio
TABLA 24:	Caracterización manganeso
TABLA 25:	Caracterización hierro
TABLA 26:	Valores de referencia de inmisión atmosférica
TABLA 27:	Inmisión atmosférica
TABLA 28:	Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y especie. Macronutrientes
TABLA 29:	Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y especie. Micronutrientes
TABLA 30:	Resultados medios del análisis de desfronde
TABLA 31:	Resultados de la evaluación fenológica
TABLA 32:	Valor medio dendrómetros
TABLA 33:	Valores medios meteorológicos
TABLA 34:	Parámetros de estrés meteorológico
TABLA 35:	Índices de Área Foliar

INDICE DE FIGURAS

FIG 1:	Posición y vistas de la parcela
FIG 2:	Climodiagrama de la parcela
FIG 3:	Caracterización dasométrica de la parcela
FIG 4:	Histograma de defoliaciones por clases de daño y defoliación media
FIG 5:	Tipos de defoliación
FIG 6:	Daños forestales
FIG 7:	Instrumentación
FIG 8:	Variación temporal de pH
FIG 9:	Variación temporal de conductividad
FIG 10:	Variación temporal de potasio
FIG 11:	Variación temporal de calcio
FIG 12:	Variación temporal de magnesio
FIG 13:	Variación temporal de sodio
FIG 14:	Variación temporal de amonio
FIG 15:	Variación temporal de cloro
FIG 16:	Variación temporal de nitratos
FIG 17:	Variación temporal de sulfatos
FIG 18:	Variación temporal de alcalinidad
FIG 19:	Variación temporal de nitrógeno total
FIG 20:	Variación temporal de carbono orgánico disuelto
FIG 21:	Variación temporal de aluminio
FIG 22:	Variación temporal de manganeso
FIG 23:	Variación temporal de hierro
FIG 24:	Variación temporal de inmisión por dosímetros
FIG 25:	Evolución de macronutrientes
FIG 26:	Evolución de micronutrientes
FIG 27:	Fracciones de desfronde o litterfall. Serie histórica
FIG 28:	Fases fenológicas. Inicio de fase
FIG 29:	Fases fenológicas
FIG 30:	Crecimiento diametral anual. Crecimientos mensuales dendrómetros y media parcela
FIG 31:	Principales variables meteorológicas
FIG 32:	Índices de Área Foliar
FIG 33:	Fotos hemisféricas

1. Situación de la parcela.

La parcela representa el pinar de *Pinus pinea* del Sector Onubense litoral de la Provincia Gaditano-Onubo-Algarviense (Rivas-Martínez).

Sus principales características se resumen en la siguiente tabla:

TABLA 1: Características de la parcela.

PARCELA	ESPECIE	PROVINCIA	T. MUNICIPAL	REPLANTEO	LTER
10 Ppa	<i>Pinus pinea</i>	Huelva	Almonte	18/07/1993	ES-014

LATITUD	LONGITUD	XUTM	YUTM	ALTITUD	PENDIENTE	ORIENTACIÓN	PARAJE
+37°09'00"	-06°44'00"	168.000	4.118.000	65	0	Plano	Los Bodegones




FIG 1: Posición y vistas de la parcela 10Ppa.

2. Caracterización de la parcela.

2.1. Climatología.

Las principales características de la parcela se dan en la siguiente tabla:

TABLA 2: Datos meteorológicos estación ecológica (Modelos y Cartografía de Estimaciones Climáticas Termopluviométricas de la España Peninsular. Sánchez Palomares et al. Datación 1940-1990. INIA, 1999).

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
T(°C)	10,5	11,5	13,2	15,9	18,6	21,5	24,8	25,4	22,3	18,3	14	10,8	17,2
P(mm)	93	82	83	55	32	19	1	3	18	68	78	96	627
T. Media Máximas Mes más Cálido								33,3					
	5,1	T. Media Mínimas Mes más Frío											

De acuerdo a clasificación de Allué, el clima se corresponde con un IV2 *Mediterráneo Genuino*. De acuerdo a la clasificación en pisos bioclimáticos, la parcela se encuentra en el *Piso Termomediterráneo*.




FIG 2: Climodiagrama de la parcela


2.2. Geología y Suelos.

Litología: arenas.

Edafología: Gleyc Arenosol.

La topografía particularmente llana, la textura arenosa y drenaje moderado son los rasgos mas destacados de los suelos de la parcela. Textura arenosa y drenaje moderado son aspectos aparentemente contrapuestos. Ciertamente, la textura arenosa determina una permeabilidad muy rápida, pero el drenaje interno es deficiente. Ello se debe a la existencia de una capa freática cuyo nivel superior se sitúa dentro del metro superficial. La saturación del suelo con agua, al menos temporal, y el consecuente ambiente reductor

es la causa de otros dos aspectos importantes en estos suelos: limitación del desarrollo radicular en profundidad y la existencia de abundantes y grandes concreciones de sesquióxidos.



Horizonte	Espesor (cm)	Descripción
O	0-2	Capa orgánica, construida por acículas de pino poco descompuestas.
A	0-20	Gris parduzco claro (10 YR 6/2) en seco, pardo amarillento (10 YR 4.5/4) en húmedo; arenoso; estructura grumosa, fina, debil; consistencia suelta en húmedo; frecuentes raíces gruesas; abundantes poros, muy finos; no se aprecia actividad de la fauna; límite gradual y plano.
C	20-65	Pardo muy claro (10 YR 7/3.5) en húmedo; arenoso; estructura poliédrica subangular, mediana, débil; consistencia suelta en húmedo; escasas raíces, gruesas; abundantes poros muy finos; límite difuso y plano.
C _{gi}	65-115	Amarillo pálido (2.5 Y 7/4) en húmedo; arenoso; estructura suelta; muy friable en húmedo; abundantes poros muy finos; límite difuso y plano.
C*	115	Amarillo pálido (2.5 Y 8/5) en húmedo; arenoso; sin estructura; muy friable en húmedo; muy poroso; frecuentes (30%) nódulos irregulares grandes (3-10 cm) y con consistencia firme en húmedo.

2.3. Vegetación.

Vegetación actual: Parcela llana, en arenal subcostero. Bajo una cubierta más o menos densa de pino piñonero hay un matorral bastante uniforme. El suelo arenoso apenas tiene una cobertura de herbáceas, sin embargo se encuentra cubierto casi en su totalidad por pinocha (98 %). En las cercanías de la parcela se ha encontrado *Chamaerops humilis*, *Erica scoparia*, *Cistus crispus*, *Cistus libanotis* y *Phillyrea angustifolia*, no presentes en la misma.

TABLA 3: Inventario florístico 2007-2009

	Cob		Cob
ESTRATO ARBÓREO	80,00	<i>Iberis ciliata</i> All.	+
<i>Pinus pinea</i> L.	80,00	<i>Kickxia cirrhosa</i> (L.) Fritsch	+
ESTRATO ARBUSTIVO	55,50	<i>Lavandula stoechas</i> L.	+
<i>Cytisus grandiflorus</i> DC.	0,30	<i>Leontodon taraxacoides</i> (Vill.) Mérat	+
<i>Erica scoparia</i> L.	0,20	<i>Linaria sparteae</i> (L.) Willd.	+
<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	53,00	<i>Pinus pinea</i> L.	+
<i>Ulex eriocladius</i> C. Vicioso	2,00	<i>Pterocephalus diandrus</i> (Lag.) Lag.	+
EST. SUBARBUSTIVO-HERBACEO	29,00	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	28,00
<i>Andryala laxiflora</i> DC.	+	<i>Silene scabriflora</i> Brot.	+
<i>Anthoxanthum aristatum</i> Boiss.	+	<i>Stauracanthus genistoides</i> (Brot.) Samp.	+
<i>Asparagus officinalis</i> L.	+	<i>Thapsia</i> sp.	+
<i>Brachypodium distachyon</i> (L.) Beauv.	+	<i>Thymus mastichina</i> L.	+
<i>Briza maxima</i> L.	+	<i>Tolpis barbata</i> (L.) Gaertner	+
<i>Crepis capillaris</i> (L.) Wallr.	+	<i>Tuberaria guttata</i> (L.) Fourr.	+
<i>Cytisus grandiflorus</i> DC.	+	ESTRATO MUSCINAL-LIQUENICO	0,50
<i>Elaeoselinum foetidum</i> (L.) Boiss.	+	<i>Cladonia cervicornis</i>	+
<i>Halimium lasianthum</i> (Lam.) Spach	+	<i>Cladonia rangiformis</i>	+

Vegetación potencial: La parcela se encuentra en la serie 26b Serie termomediterránea gaditano-onubo-algarviense y marianico-monchiquense subhúmeda silícicola de *Quercus suber* o alcornoque (*Oleo Querceto suberis sigmetum*). Pertenece a la faciación gaditano-onubense sobre arenales con *Halimium halimifolium*.

2.4. Caracterización forestal y dasométrica.

La parcela se sitúa en una masa monoespecífica regular de pinar de piñonero en estado de fustal de 61-80 años de edad, cuyas características principales se resumen a continuación:

TABLA 4: Características dasométricas. Área de la parcela, número de pies en la parcela, densidad en pies/ha, Número de pies de la especie principal, número de pies de otras especies, número de pies muertos, edad media, diámetro medio, área basimétrica, diámetro medio cuadrático, altura media, altura dominante según criterio diámetro, existencias, carbono fijado (partes aérea y radical). Existencias según IFN3

Área ha	N par	N/ha	Sp.p	Otras	Muerto	Edad años	D med (cm)	AB m ² /ha	D m c cm	Alt m m	Alt do m	Exist m ³ cc	C (t)
0,2500	62	248	62	0	39	61-80	28,66	16,31	28,94	12,25	12,65	20,79	n.d




FIG 3: Distribución diamétrica de la parcela; distribución de alturas y comparación con las alturas media y dominante; relación de alturas-diámetros; frecuencias, alturas, esbelteces y existencias por clase diamétrica.

3. Estado fitosanitario de la parcela.

3.1. Defoliación y decoloración.

En la presente revisión, la parcela presenta un buen estado fitosanitario, con una defoliación media del 19,29%, dentro por tanto de la escala de daños ligeros, categoría en la que se han calificado más del 90% de los pies, en lo que supone una apreciable mejoría con respecto a la revisión del año anterior, reduciéndose el parámetro en casi cinco puntos porcentuales, próximo al umbral de cinco que supone una variación estadística significativa de acuerdo a la normativa europea en materia de redes forestales, con una de las distribuciones de arbolado más favorables desde el replanteo de la parcela, sin apenas pinos calificados con daños moderados.

Cabe destacar también que la parcela se encuentra a pocos cientos de metros del perímetro del incendio que afectó a Doñana entre el 24 de junio y 4 de julio de 2017; y que afectó a casi 8.500 ha de superficie; si bien no llegó a interesar al arbolado muestra. Pese a lo cual debe ser tenido en cuenta como elemento perturbador en la parcela. Tras las cortas efectuadas en las inmediaciones de la parcela, y a partir de 2018, se han incrementado considerablemente los escolítidos perforadores tales como *Tomicus destruens*, que tras afectar a casi la totalidad del arbolado muestra en 2023 se reducen hasta el 20% de los pies durante el último año.

Atendiendo a la serie histórica de datos se advierte un marcado empeoramiento desde 2014, con un incremento de la defoliación próximo a diez puntos porcentuales, y superándose los máximos locales de 1995 y 2002, con un episodio de deterioro muy marcado en 2015-2017 y un episodio de pico debido al aclareo de la parcela en 2009-2010, situación esta que parece superarse durante la última revisión. Cabe destacar en esta parcela las malas condiciones para el desarrollo del arbolado, situado en una zona de escasas precipitaciones, sobre un suelo muy arenoso y con escasa capacidad de retención de agua, matizado por el hecho de encontrarse la capa freática a escasa profundidad. Las defoliaciones causadas en las ramas más bajas debidos a la acción del hongo defoliador *Thyriopsis halepensis*, endémico en los pinares de la zona, no ayudan tampoco al mantenimiento de un buen estado de salud.

Los principales resultados pueden verse en el gráfico adjunto:




FIG 4: Histograma de defoliaciones por clases de daño y defoliación media de la parcela. Serie histórica.



FIG 5: Defoliación 10%, 35% y 80%

3.2. Daños forestales.

Los principales agentes dañinos identificados se resumen en la siguiente tabla, indicándose el número de pies afectados, sus características dendrométricas, defoliación y decoloración asociadas y la diferencia con los valores medios de la parcela.

TABLA 5: Distribución de agentes dañinos en la parcela: pies afectados (Npar), Extensión de los daños en clases de porcentajes en grado de 1 a 7 (Extensión), pies afectados por ha (N/ha), porcentaje de pies afectados (%), defoliación y decoloración de los pies afectados por cada agente (Defo/Deco), diferencia de las defoliaciones y decoloraciones con las medias de la parcela (DifDefo y DifDeco, marcados en **rojo** si el valor de los pies afectados es superior al valor medio de la parcela y en **verde** en caso contrario), diámetro (Diam) y altura medias (Alt) de los pies afectados por cada agente y diferencias con los valores medios de la parcela (DifDiam y DifAlt).

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
INSECTOS												
Defoliadores	14	1,00	56	22,58	18,21	0,00	-0,58	0,00	28,14	12,01	-0,52	-0,24
Acíc. antiguas	2	1,00	8	3,23	20,00	0,00	1,21	0,00	29,50	11,85	0,84	-0,40
<i>Brachyderes suturalis</i>	12	1,00	48	19,35	17,92	0,00	-0,87	0,00	27,92	12,03	-0,74	-0,22
Acíc. antiguas	12	1,00	48	19,35	17,92	0,00	-0,87	0,00	27,92	12,03	-0,74	-0,22
Perforadores	12	1,00	48	19,35	16,25	0,00	-2,54	0,00	29,67	12,77	1,01	0,52
<i>Tomicus destruens</i>	12	1,00	48	19,35	16,25	0,00	-2,54	0,00	29,67	12,77	1,01	0,52
Brotos del año	12	1,00	48	19,35	16,25	0,00	-2,54	0,00	29,67	12,77	1,01	0,52
Chupadores	9	1,00	36	14,52	17,78	0,00	-1,01	0,00	29,11	12,72	0,45	0,47
Acíc. antiguas	9	1,00	36	14,52	17,78	0,00	-1,01	0,00	29,11	12,72	0,45	0,47
ENFERMEDADES												
Hongos/Royas acíc	62	1,00	248	100,00	18,79	0,00	0,00	0,00	28,66	12,25	0,00	0,00
<i>Thyriopsis halepensis</i>	62	1,00	248	100,00	18,79	0,00	0,00	0,00	28,66	12,25	0,00	0,00
Acíc. antiguas	62	1,00	248	100,00	18,79	0,00	0,00	0,00	28,66	12,25	0,00	0,00
AG.ABIÓTICOS												
Calor	38	1,26	152	61,29	19,34	0,00	0,55	0,00	28,74	12,23	0,08	-0,02
Acíc. antiguas	38	1,26	152	61,29	19,34	0,00	0,55	0,00	28,74	12,23	0,08	-0,02
Viento/Tornado	6	1,00	24	9,68	19,17	0,00	0,38	0,00	26,67	12,13	-1,99	-0,12
Ramillos <2 cm	5	1,00	20	8,06	20,00	0,00	1,21	0,00	25,20	11,92	-3,46	-0,33
Ramas 2-10 cm	1	1,00	4	1,61	15,00	0,00	-3,79	0,00	34,00	13,20	5,34	0,95
AG.DESCONOCIDO												
Ag.desconocido	70	1,03	280	100,00	18,50	0,00	-0,29	0,00	28,63	12,27	-0,03	0,02
Acíc. antiguas	1	1,00	4	1,61	15,00	0,00	-3,79	0,00	29,00	12,10	0,34	-0,15
Brotos del año	27	1,00	108	43,55	18,33	0,00	-0,46	0,00	28,41	12,44	-0,25	0,19
Ramillos <2 cm	18	1,00	72	29,03	18,89	0,00	0,10	0,00	28,72	11,99	0,06	-0,25
Tronco	23	1,00	92	37,10	18,26	0,00	-0,53	0,00	28,78	12,28	0,12	0,03
Tronco completo	1	3,00	4	1,61	25,00	0,00	6,21	0,00	29,00	12,60	0,34	0,35

Una de las características más importantes del pinar en el que se encuentra la parcela es el importante incendio que tuvo lugar en la zona de Moguer-Doñana en el mes de junio de 2017 y que se prolongó durante diez días, quedando detenido a corta distancia de la parcela, sin llegar a afectar directamente al arbolado muestra pero con indudable influencia en su comportamiento. Tras el incendio y a través de trabajos selvícolas de policía se han ido cortando los pies muertos o debilitados que pudieran constituir un foco para el desarrollo de escolítidos u otros agentes oportunistas y comprometer el estado

fitosanitario de la masa remanente. Se llevaron a cabo una serie de cortas de policía acompañadas de retirada y astillado de los residuos leñosos que redujeron en gran medida la capacidad de desarrollo de la plaga, que no llegó a afectar a más del 15% del arbolado muestra, poniendo de manifiesto la efectividad de los tratamientos selvícolas como elemento de control fitosanitario de la masa.

Durante la primera mitad de 2023 se efectuó una corta junto al límite oriental de la parcela, que si bien se hizo también con control y extracción de los residuos leñosos generados, como las operaciones posteriores al incendio, favoreció la proliferación del escolítido *Tomicus destruens* que llegó a afectar a la mayoría del arbolado muestra, con numerosos los ramillos terminales muertos y perforados en su base caídos por el suelo, menudeando a partir del mes de abril, y apareciendo ramillos terminales puntisecos causados por la alimentación de maduración sexual del insecto sobre algo más del 90% de los pies. La existencia de esta importante población puede llegar a desequilibrar la masa, causando daños de importancia si las siguientes generaciones llegan a desarrollar galerías larvarias sobre los troncos. En algunas zonas incluso se llega a superar el nivel de 5 ramillos por metro cuadrado que en algunas publicaciones se configuraba como un primer nivel de alerta. En la presente revisión, el nivel de afección por este escolítido se ha reducido hasta el 15% del arbolado muestra desde el 25% del año previo, lo que indicaría una progresiva superación del fenómeno de decaimiento.

En cuanto al conjunto de agentes de daño identificados, continúa la ausencia de la procesionaria del pino, *Thaumetopoea pityocampa* durante la actual revisión, tal como ya ocurriera el año anterior, no registrándose en la zona desde el ataque del invierno de 2019.

Cabe hacer constar la característica diapausa de este lepidóptero, fenómeno por el cual parte de la población de adultos procedentes de la campaña anterior no emerge en la siguiente, configurándose un reservorio que puede dar lugar a nuevos ataques, de darse una serie de factores desencadenantes insuficientemente explicados por la literatura hasta el momento y que conforma un comportamiento en picos con explosiones esporádicas. El carácter errático del defoliador condiciona el comportamiento fitosanitario de la parcela, que a las malas condiciones edáficas y la presencia endémica del hongo defoliador *Thyriopsis halepensis*, suma los ataques esporádicos de la procesionaria y ataques esporádicos del perforador *Tomicus destruens* en aparente reducción desde el máximo de 2023. Se ha visto también alguna mordedura en el margen foliar de las acículas de mayor edad debidas a la acción de **defoliadores** de tipo braquiderino, junto con alguna punteadura clorótica debida a la acción de insectos **chupadores**, advirtiéndose al tacto la secreción de resina causada como reacción a la introducción del aparato suctor, en niveles similares a los de la revisión anterior.

En cuanto a la presencia de hongos, se advierte la presencia generalizada del hongo defoliador *Thyriopsis halepensis* en las acículas caídas en el suelo que actúa como reservorio del patógeno, infectando al pinar a lo largo de la primavera siguiente, dependiendo el grado de infección básicamente de las condiciones climáticas, y que al afectar básicamente a las ramas más bajas da al arbolado un aspecto similar al del soflamado, concentrándose la defoliación en la parte baja de la copa mientras que la superior presenta mucho mejor aspecto y apareciendo los daños a finales de la primavera, primero con un amarilleamiento brusco seguido de la caída prematura del follaje afectado. De esta enfermedad se advierten las habituales punteaduras necróticas amarillentas orladas por una corona de cuerpos de fructificación negruzcos, que acaban por secar las acículas infectadas y hacerlas caer. El agente acaba por defoliar prematuramente la metida de tres años del hospedante y se superpone a los efectos normales de la autopoda por falta de luz y a la pérdida de acículas asociada a la sequía, responsable todo en último extremo de una ramificación baja escasamente poblada, cuando no muerta, muy frecuente en todos los pinares de la zona, que se asientan además sobre suelos muy arenosos, con escasa capacidad de retención de agua.

Durante la presente revisión se advierten decoloraciones amarillentas en las acículas de mayor edad, de 2 años y la escasa fracción de 3, que además de la influencia de *Thyriopsis halepensis*, pudieran deberse al efecto de las elevadas temperaturas estivales, en cerca de dos de cada tres pinos evaluados, al evaluarse la

parcela en plena ola de **calor** a mediados de agosto y tras haberse superado otros dos fenómenos de altas temperaturas en la segunda mitad de junio y a mediados de julio, sin que se vean efectos de sequía, tan frecuentes en anteriores revisiones, al haberse acumulado cerca de 500 mm entre enero y junio y que contrastan con los 350 mm del año previo. Se advierte también, sin mayor importancia, alguna rotura mecánica de ramas de pequeño diámetro por **viento**.

Tradicionalmente están muy extendidos los daños por falta de luz en la ramificación inferior de los pies, a la que se superpone la presencia del hongo defoliador *Thyriopsis halepensis*, pese a lo cual el arbolado ha quedado con una densidad correcta, en torno a 240 pies/ha, como pone de manifiesto el mejor estado de la corona superior de las copas. En este sentido cabe apuntar la homogénea distribución del dosel arbóreo, sin que se observen pies dominados situados claramente bajo el nivel medio de la masa. En términos generales se observa mayor vigor del arbolado tras las operaciones de clara de la masa.

Por último, y sin que se pueda determinar la causa con exactitud, se observan algunas **tumoraciones** aisladas que si bien en algún caso resultan muy patentes, no se encuentran asociadas a daños forestales de consideración, junto con **puntisecado** de ramillos o **aborto** de brotes del año sin mayor trascendencia.

El conjunto de **síntomas y signos** observados se resumen en la tabla adjunta.

TABLA 6: Distribución de síntomas y signos en la parcela: pies afectados (Npar), Extensión de los daños en clases de porcentajes en grado de 1 a 7 (Extensión), pies afectados por ha (N/ha), porcentaje de pies afectados (%), defoliación y decoloración de los pies afectados por cada agente (Defo/Deco), diferencia de las defoliaciones y decoloraciones con las medias de la parcela (DifDefo y DifDeco, marcados en **rojo** si el valor de los pies afectados es superior al valor medio de la parcela y en **verde** en caso contrario), diámetro (Diam) y altura medias (Alt) de los pies afectados por cada agente y diferencias con los valores medios de la parcela (DifDiam y DifAlt).

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
HOJAS/ACÍCULAS												
Acíc. antiguas	124	1,08	496	100,00	18,79	0,00	0,00	0,00	28,66	12,25	0,00	0,00
Comidos/perdidos	76	1,00	304	100,00	18,68	0,00	-0,11	0,00	28,57	12,20	-0,10	-0,04
Agujeros/Parc. comidas	2	1,00	8	3,23	20,00	0,00	1,21	0,00	29,50	11,85	0,84	-0,40
Muecas	12	1,00	48	19,35	17,92	0,00	-0,87	0,00	27,92	12,03	-0,74	-0,22
Caída prematura	62	1,00	248	100,00	18,79	0,00	0,00	0,00	28,66	12,25	0,00	0,00
Dec. Verde-amarillo	48	1,21	192	77,42	18,96	0,00	0,17	0,00	28,81	12,32	0,15	0,07
Completa	38	1,26	152	61,29	19,34	0,00	0,55	0,00	28,74	12,23	0,08	-0,02
Punteado	9	1,00	36	14,52	17,78	0,00	-1,01	0,00	29,11	12,72	0,45	0,47
Apical	1	1,00	4	1,61	15,00	0,00	-3,79	0,00	29,00	12,10	0,34	-0,15
RAMAS/BROTES												
Brotes del año	39	1,00	156	62,90	17,69	0,00	-1,10	0,00	28,79	12,54	0,13	0,29
Muerto/moribundo	26	1,00	104	41,94	18,08	0,00	-0,71	0,00	28,38	12,48	-0,28	0,23
Aborto	13	1,00	52	20,97	16,92	0,00	-1,87	0,00	29,62	12,67	0,95	0,42
Ramillos <2 cm	23	1,00	92	37,10	19,13	0,00	0,34	0,00	27,96	11,98	-0,70	-0,27
Rotura	5	1,00	20	8,06	20,00	0,00	1,21	0,00	25,20	11,92	-3,46	-0,33
Muerto/moribundo	18	1,00	72	29,03	18,89	0,00	0,10	0,00	28,72	11,99	0,06	-0,25
Ramas 2-10 cm	1	1,00	4	1,61	15,00	0,00	-3,79	0,00	34,00	13,20	5,34	0,95
Rotura	1	1,00	4	1,61	15,00	0,00	-3,79	0,00	34,00	13,20	5,34	0,95
TRONCO/C.RAÍZ												
Tronco	23	1,00	92	37,10	18,26	0,00	-0,53	0,00	28,78	12,28	0,12	0,03
Deformaciones	22	1,00	88	35,48	18,41	0,00	-0,38	0,00	28,82	12,25	0,16	0,00
Tumores	22	1,00	88	35,48	18,41	0,00	-0,38	0,00	28,82	12,25	0,16	0,00
Resinosis	1	1,00	4	1,61	15,00	0,00	-3,79	0,00	28,00	13,00	-0,66	0,75

	N par	Extensión	N/ha	%	Defo	Deco	Dif Defo	Dif Deco	Diam	Alt	Dif Diam	Dif Alt
Tronco completo	1	3,00	4	1,61	25,00	0,00	6,21	0,00	29,00	12,60	0,34	0,35
Deformaciones	1	3,00	4	1,61	25,00	0,00	6,21	0,00	29,00	12,60	0,34	0,35
Tumores	1	3,00	4	1,61	25,00	0,00	6,21	0,00	29,00	12,60	0,34	0,35

Por último, se presenta a continuación la relación entre agentes dañinos identificados y los distintos síntomas observados.

TABLA 7: Relación entre agentes, síntomas y signos observados.


	N par	Defoliadores		Perforadores		Chupadores		Hongos/Royas acíc	
		n	%	n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍCULAS									
Acíc. antiguas	124	14	100,00			9	100,00	62	100,00
Comidos/perdidos	76	14	100,00					62	100,00
Agujeros/Parc. comidas	2	2	14,29						
Muecas	12	12	85,71						
Caída prematura	62							62	100,00
Dec. Verde-amarillo	48					9	100,00		
Completa	38								
Punteado	9					9	100,00		
Apical	1								
RAMAS/BROTES									
Brotes del año	39			12	100,00				
Muerto/moribundo	26			12	100,00				
Aborto	13								
Ramillos <2 cm	23								
Rotura	5								
Muerto/moribundo	18								
Ramas 2-10 cm	1								
Rotura	1								
TRONCO/C.RAÍZ									
Tronco	23								
Deformaciones	22								
Tumores	22								
Resinosis	1								
Tronco completo	1								
Deformaciones	1								
Tumores	1								


	N par	Calor		Viento/Tornado		Ag.desconocido	
		n	%	n	%	n	%
HOJAS/ACÍCULAS							
Acíc. antiguas	124	38	100,00			1	1,43
Comidos/perdidos	76						
Agujeros/Parc. comidas	2						


	N par	Calor		Viento/Tornado		Ag.desconocido	
		n	%	n	%	n	%
Muestras	12						
Caída prematura	62						
Dec. Verde-amarillo	48	38	100,00			1	1,43
Completa	38	38	100,00				
Punteado	9						
Apical	1					1	1,43
RAMAS/BROTES							
Brotes del año	39					27	38,57
Muerto/moribundo	26					14	20,00
Aborto	13					13	18,57
Ramillos <2 cm	23			5	83,33	18	25,71
Rotura	5			5	83,33		
Muerto/moribundo	18					18	25,71
Ramas 2-10 cm	1			1	16,67		
Rotura	1			1	16,67		
TRONCO/C.RAÍZ							
Tronco	23					23	32,86
Deformaciones	22					22	31,43
Tumores	22					22	31,43
Resinosis	1					1	1,43
Tronco completo	1					1	1,43
Deformaciones	1					1	1,43
Tumores	1					1	1,43



FIG 6: Tumoración en la base del tronco. Aborto del brote del año







Los dos principales parámetros para evaluar el estado de salud en masas forestales son la **defoliación** y **decoloración**

DEFOLIACION: se entiende por defoliación la pérdida de hojas/acículas que sufre un árbol en la parte de su copa evaluable, es decir, eliminando del proceso de estima la copa muerta (ramas y ramillos claramente muertos) y la parte de la copa con ramas secas por poda natural o competencia.

De acuerdo con la normativa europea, se consideran las siguientes clases de defoliación o daño:

- ✓ **Arboles sin daño:** defoliación 0-10%
- ✓ **Ligeramente dañados:** defoliación 15-25%
- ✓ **Moderadamente dañados:** defoliación 30-60%
- ✓ **Gravemente dañados:** defoliación 65-95%
- ✓ **Arboles muertos:** defoliación 100%

DECOLORACION: se entiende por decoloración, la aparición de coloraciones anormales en la totalidad del follaje o en una parte apreciable del mismo, utilizándose en su evaluación un criterio subjetivo que implica el conocimiento del medio forestal correspondiente por parte del evaluador.

De acuerdo con la normativa europea, se consideran las siguientes clases de decoloración:

- ✓ **Clase 0:** decoloración nula
- ✓ **Clase 1:** decoloración ligera
- ✓ **Clase 2:** decoloración moderada
- ✓ **Clase 3:** decoloración grave



4. Instrumentación.

Para el seguimiento intensivo y continuo de la parcela están instalados los siguientes equipos de medición:

TABLA 8: Equipos de medición instalados en la parcela. Periodicidad quincenal 1997-2011; Mensual desde 2012

Variable	Equipo	Parcela Interior	Parcela Exterior	Instalación	Periodicidad
Meteorología	Torre meteorológica		1	1997	Quincenal/Mensual
	Placa solar		1		
	Meteodata		1		
	Anemómetro		1		
	Veleta		1		
	Piranómetro		1		
	Termómetro		1		
	Sonda Humedad		1		
	Pluviómetro		1		
Precipitación incidente	Acumuladores		4	1997	Quincenal/Mensual
	Pluviómetro		1		
	Captador nieve		-		
Trascolación	Acumuladores	6		1997	Quincenal/Mensual
	Pluviómetro	1			
	Captador nieve	-			
Desfronde	Captadores desfronde	4		1999	Quincenal/Mensual
Inmisión	Dosímetros pasivos		12	2000	Quincenal/Mensual
Crecimiento	Dialdendro en continuo	15		1999	Quincenal/Mensual
Fenología	Árboles de seguimiento	20		1997	Quincenal/Mensual



FIG 7 : Torre meteorológica. Parcela interior. Acumuladores de deposición. Dialdendro. Data-logger. Dosímetros pasivos

5. Deposición atmosférica.

La **deposición atmosférica** es un conjunto de procesos que conducen al depósito de materiales ajenos (a través de hidrometeoros, aerosoles o movimientos de gases) sobre la superficie descubierta del suelo o sobre la superficie exterior de árboles y plantas (troncos, ramas y hojas). La deposición depende de la concentración de contaminantes en una estación y momento determinados, lo que a su vez es función de la situación y actividad de las fuentes de emisión (grandes núcleos urbanos o industrias) así como de las condiciones atmosféricas, que determinan no sólo el movimiento de los contaminantes sino la reactividad entre los mismos.

La deposición atmosférica total consta de tres componentes:

- ✓ **Deposición seca:** depósito directo de los contaminantes sobre la superficie del suelo, el agua y la vegetación. Es el tipo de deposición más abundante en las zonas próximas a los focos de emisión.
- ✓ **Deposición húmeda:** depósito arrastrado hacia el ecosistema por la lluvia o la nieve. Previa unión de los contaminantes a las nubes o gotas de precipitación. Es el tipo de deposición más abundante en las zonas alejadas de los focos de emisión.
- ✓ **Deposición por nubes, niebla y oculta:** la vegetación intercepta directamente el agua y los contaminantes de las nubes, niebla, rocío y escarcha.

Para desarrollar un programa de seguimiento de los efectos de la contaminación atmosférica sobre la salud de los bosques, uno de los objetivos principales del programa, es necesario disponer de una estimación de la cantidad de contaminantes que entran periódicamente por unidad de superficie. Como sistema de medición más económico y eficaz se ha desarrollado el **método de trascolación**, empleado en todo el sistema ICP-Forests, que permite la estimación de las deposiciones total y seca, el cálculo de la deposición húmeda y la caracterización de los procesos de interacción entre los contaminantes que tienen lugar dentro del arbolado.

Para caracterizar la deposición se toman como vías de entrada al ecosistema:

- ✓ **Precipitación en campo abierto:** denominada también precipitación incidente o *bulk deposition*, que llega al suelo directamente desde el cielo, sin atravesar el dosel arbóreo y que se corresponde con la deposición húmeda
- ✓ **Precipitación bajo dosel arbóreo:** denominada también trascolación o *throughfall* en la que se recoge el agua que llega al suelo tras atravesar el follaje de la masa forestal, tras mojar la superficie de las copas e interaccionar con ellas, arrastrando parte de la deposición seca previamente caída, así como la precipitación húmeda.

La toma de muestras se hace en una batería de colectores normalizados situados a campo abierto y bajo cubierta arbórea y se analizan en una serie de laboratorios de referencia convenientemente intercalibrados entre sí, a través de un exhaustivo sistema de control y aseguramiento de calidad, de forma que resulten intercomparables y coherentes entre sí los resultados obtenidos en los países integrantes del programa. Para el cálculo de la deposición hay que tener en cuenta tanto la cantidad de precipitación al ecosistema como la concentración de los diferentes solutos en la misma.

Como variables de medición de la deposición, el manual considera los siguientes parámetros:

TABLA 9: parámetros descriptores de la deposición atmosférica en los ecosistemas forestales del Programa ICP-Forests.

Variable	Descripción	Valores de referencia RTSAP (*)
pH	Medida de la acidez o basicidad. Se considera lluvia ácida con valores $\leq 5,65$.	6,5 – 9,5
Conductividad	Índice de la presencia general de solutos en el agua.	$\leq 2.500 \mu\text{S/cm}$
Calcio	Elementos que se encuentran en el agua de lluvia debido fundamentalmente a su origen terrígeno, al formar parte de la mayoría de los suelos, especialmente en zonas de terreno calizo.	n.d
Magnesio		n.d
Potasio		n.d
Sodio	Elementos de origen marino, dependiendo su presencia de la distancia a la línea de costa. Papel tóxico en la vegetación	200 mg/l
Cloro		250 mg/l
Amonio (nitrógeno en	Procede de emisiones contaminantes a la atmósfera fundamentalmente de actividades agrícolas o ganaderas. Papel en la acidificación de los suelos.	0,50 mg/l

Variable	Descripción	Valores de referencia RTSAP (*)
forma de)		
Nitratos (nitrógeno en forma de)	Producidos por la actividad industrial, doméstica y de transporte, ligados a procesos de combustión y responsables de la acidificación de la deposición que llega a los ecosistemas forestales. Papel precursor (N) en la formación de ozono, contaminante secundario en forma de aerosol.	50 mg/l
Sulfatos (azufre en forma de)		250 mg/l
Alcalinidad	Capacidad para neutralizar los ácidos disueltos	
Nitrógeno total	Nitrógeno total disuelto presente en la deposición	
Carbono orgánico disuelto	Carbono presente en la muestra procedente de materia orgánica	
Aluminio	Metales pesados	0,2 mg/l
Manganeso		0,05 mg/l
Hierro		0,2 mg/l

(*)RTSAP: Reglamento Técnico-Sanitario de Aguas Potables.

Se caracteriza a continuación la deposición atmosférica en la parcela 10Ppa, pasando revista a la evolución de los distintos parámetros a lo largo de la series histórica estudiada, haciendo la salvedad de que se trata de años completos, a excepción de los años 1997 (mayo-diciembre); 2012 (enero-julio) y 2014 (abril-diciembre), por lo que caben ciertas anomalías.

De cada parámetro se da el comportamiento del parámetro, la diferencia existente entre trascolación (bajo cubierta arbórea) y precipitación incidente (a campo abierto), lo que da idea tanto del papel del arbolado como sumidero como de la incidencia de la deposición seca, así como la distribución por trimestres de cada deposición, con objeto de caracterizar una posible tendencia temporal en el aporte de polutentes al ecosistema.

5.1. pH.

TABLA 10: Caracterización pH. Media anual ponderada por volumen (en rojo valores anuales < 5,65), porcentaje de muestreos en los que se ha obtenido pH < 5,65 (lluvia ácida), precipitación anual y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Lluvia ácida (%)	Precipit. (mm)	Media pond	Lluvia ácida (%)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
1997	6,34	0,00	267	6,35	0,00	413	5,89	6,23
1998	6,25	10,00	319	6,88	0,00	421	5,78	6,12
1999	6,29	0,00	299	6,65	0,00	472	6,16	6,33
2000	6,20	14,29	391	6,42	0,00	643	6,06	6,27
2001	6,23	0,00	485	5,87	36,36	869	5,76	5,88
2002	6,68	0,00	245	6,54	0,00	423	6,39	6,53
2003	6,51	0,00	519	5,83	26,67	896	6,07	6,14
2004	6,32	0,00	320	5,82	30,00	518	5,99	6,00
2005	6,17	9,09	112	6,09	16,67	170	5,96	5,93
2006	6,31	0,00	495	5,79	40,00	848	6,08	6,01
2007	6,30	0,00	329	5,37	53,85	517	5,98	5,72
2008	6,53	0,00	437	5,73	55,56	615	6,12	5,97
2009	6,13	0,00	330	5,41	28,57	527	6,10	6,07
2010	6,26	0,00	696	6,00	0,00	1138	6,22	6,19
2011	6,57	0,00	377	5,81	20,00	584	6,06	6,02

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II

AÑO 2025

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Lluvia ácida (%)	Precipit. (mm)	Media pond	Lluvia ácida (%)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
2012	6,26	20,00	90	5,72	40,00	141	5,96	5,98
2014	6,38	0,00	171	6,15	0,00	295	6,17	6,20
2015	6,25	0,00	231	5,75	14,29	387	6,08	6,18
2016	6,33	0,00	410	6,02	0,00	632	6,16	6,12
2017	6,41	0,00	271	5,98	28,57	410	6,09	6,10
2018	6,19	0,00	448	6,01	25,00	703	5,89	5,94
2019	6,02	0,00	106	6,00	11,11	174	5,99	6,04
2020	6,23	0,00	364	5,92	33,33	567	6,17	6,17
2021	6,49	0,00	232	6,10	25,00	328	6,37	6,27
2022	6,19	0,00	377	5,90	0,00	540	6,28	6,22
2023	6,50	0,00	192	6,39	0,00	303	6,34	6,21
2024	6,60	0,00	392	6,40	0,00	610	6,42	6,39
Media	6,33	1,98	330	6,03	17,96	524	6,09	6,12




FIG 8: Variación temporal de pH, porcentaje de lluvia ácida, precipitación e intercepción (parte de precipitación retenida por follaje)

5.2. Conductividad ($\mu\text{S}/\text{cm}$).

TABLA 11: Caracterización Conductividad. Media anual ponderada por volumen, precipitación anual y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
1997	30,66		267	22,80		413	25,52	22,05

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II

Año 2025

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
1998	44,89		319	39,24		421	29,37	22,53
1999	63,18		299	36,57		472	33,18	19,89
2000	67,32		391	42,30		643	35,34	22,06
2001	45,95		485	23,48		869	27,99	15,78
2002	84,16		245	48,04		423	48,98	30,11
2003	48,77		519	25,60		896	45,96	25,07
2004	62,11		320	41,12		518	62,42	37,00
2005	115,30		112	55,64		170	65,42	30,19
2006	55,59		495	33,24		848	61,52	28,60
2007	65,08		329	37,47		517	49,85	28,88
2008	64,24		437	39,63		615	46,65	22,88
2009	61,57		330	35,56		527	49,43	20,10
2010	55,10		696	24,94		1138	44,44	15,09
2011	65,39		377	26,16		584	51,36	19,04
2012	73,76		90	48,29		141	53,38	20,50
2014	64,69		171	33,41		295	33,76	15,23
2015	56,76		231	19,42		387	45,28	18,25
2016	43,76		410	16,63		632	47,39	15,22
2017	65,08		271	21,82		410	56,13	18,87
2018	102,20		448	34,89		703	38,75	16,20
2019	163,94		106	56,91		174	74,16	28,49
2020	61,82		364	30,67		567	46,43	20,40
2021	83,01		232	32,54		328	40,51	22,14
2022	61,47		377	34,88		540	44,12	20,37
2023	106,84		192	33,51		303	45,95	17,21
2024	79,55		392	35,28		610	43,89	17,33
Media	70,08		330	34,45		524	46,19	21,83




FIG 9: Variación temporal de la conductividad.

5.3. Potasio.

TABLA 12: Caracterización Potasio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolución (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	2,04	5,44	267	0,72	2,96	413	2,49	7,33	5,18
1998	4,92	15,69	319	2,53	10,65	421	5,04	19,45	13,28
1999	4,55	13,61	299	2,18	10,28	472	3,33	17,99	11,86
2000	5,28	20,63	391	2,25	14,48	643	6,14	22,33	15,28
2001	4,19	20,34	485	1,65	14,34	869	6,01	16,00	9,92
2002	4,97	12,18	245	1,02	4,34	423	7,84	19,36	7,73
2003	3,62	18,79	519	0,24	2,16	896	16,64	12,93	3,83
2004	3,62	11,58	320	0,57	2,96	518	8,63	16,14	4,88
2005	7,95	8,91	112	1,99	3,39	170	5,52	12,47	5,15
2006	4,27	21,14	495	1,25	10,57	848	10,58	19,14	9,86
2007	5,98	19,68	329	1,20	6,20	517	13,48	20,44	7,92
2008	6,34	27,70	437	1,16	7,12	615	20,58	22,97	6,57
2009	4,89	16,12	330	0,76	3,99	527	12,14	18,05	4,28
2010	3,83	26,65	696	0,30	3,40	1138	23,26	21,96	3,59
2011	4,63	17,45	377	1,67	9,74	584	7,71	18,92	5,75
2012	2,58	2,31	90	1,54	2,17	141	0,13	2,99	0,92
2014	4,97	8,51	171	0,48	1,41	295	7,10	11,97	1,60
2015	6,18	14,29	231	0,30	1,15	387	13,14	18,33	4,20
2016	4,31	17,67	410	0,20	1,25	632	16,42	19,15	2,17

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II
AÑO 2025

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
2017	5,48	14,82	271	0,26	1,08	410	13,74	16,19	1,94
2018	5,56	24,89	448	0,44	3,11	703	21,77	17,14	2,96
2019	7,98	8,46	106	0,67	1,17	174	7,29	17,04	3,33
2020	4,97	18,09	364	0,28	1,61	567	16,49	22,26	2,32
2021	8,05	18,68	232	1,61	1,50	328	17,18	15,69	1,94
2022	4,90	18,48	377	0,28	1,53	540	16,95	18,27	1,30
2023	7,66	14,74	192	0,42	1,26	303	13,47	20,05	0,93
2024	4,62	18,14	392	0,61	3,72	610	14,42	20,53	2,02
Media	5,12	16,11	330	0,98	4,72	524	11,39	17,23	5,21




FIG 10: Variación temporal de deposición de K, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.4. Calcio.

TABLA 13: Caracterización Calcio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red



Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	1,21	3,24	267	0,78	3,22	413	0,02	7,29	5,16
1998	1,32	4,20	319	0,82	3,45	421	0,75	6,91	4,05
1999	2,45	7,32	299	0,88	4,14	472	3,18	10,77	6,68

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II

AÑO 2025

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
2000	1,88	7,36	391	0,73	4,68	643	2,68	10,94	7,70
2001	1,28	6,19	485	0,54	4,66	869	1,53	8,58	6,22
2002	2,14	5,24	245	1,05	4,45	423	0,79	12,23	9,40
2003	0,50	2,60	519	0,59	5,29	896	-2,70	23,45	26,64
2004	2,72	8,71	320	2,71	14,03	518	-5,32	18,95	20,04
2005	6,71	7,51	112	4,38	7,44	170	0,08	11,17	9,81
2006	2,44	12,06	495	1,75	14,88	848	-2,81	17,51	16,49
2007	3,18	10,46	329	1,97	10,21	517	0,25	18,16	14,99
2008	3,29	14,38	437	2,91	17,90	615	-3,53	14,94	12,47
2009	2,08	6,87	330	1,18	6,23	527	0,65	10,43	6,81
2010	1,34	9,32	696	0,70	7,98	1138	1,34	11,50	7,59
2011	2,20	8,31	377	1,16	6,75	584	1,56	11,32	6,29
2012	2,01	1,80	90	0,89	1,25	141	0,54	3,22	2,60
2014	1,99	3,40	171	2,05	6,04	295	-2,65	8,57	5,86
2015	3,22	7,45	231	1,69	6,52	387	0,93	15,19	12,39
2016	1,70	6,97	410	0,71	4,52	632	2,46	14,34	8,83
2017	5,60	15,14	271	1,37	5,63	410	9,51	13,71	10,82
2018	2,35	10,50	448	1,31	9,20	703	1,30	13,15	9,58
2019	4,48	4,75	106	2,26	3,92	174	0,83	18,41	13,57
2020	2,17	7,91	364	1,26	7,13	567	0,78	21,83	11,67
2021	3,90	9,04	232	2,41	7,89	328	1,15	13,31	19,20
2022	2,45	9,25	377	1,81	9,79	540	-0,54	16,71	13,93
2023	4,15	7,99	192	1,27	3,85	303	4,14	13,29	8,93
2024	3,49	13,68	392	1,87	11,42	610	2,26	13,85	10,52
Media	2,68	7,84	330	1,52	7,13	524	0,71	13,32	10,68






FIG 11: Variación temporal de deposición de Ca, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.5. Magnesio.

TABLA 14: Caracterización Magnesio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolución-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolución (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,85	2,26	267	0,38	1,56	413	0,70	3,66	3,20
1998	1,26	4,03	319	0,80	3,35	421	0,68	4,07	2,78
1999	1,52	4,55	299	0,56	2,64	472	1,92	4,18	2,58
2000	1,32	5,17	391	0,55	3,52	643	1,65	3,46	1,84
2001	0,79	3,83	485	0,29	2,52	869	1,31	2,99	1,45
2002	1,27	3,11	245	0,47	2,00	423	1,11	3,93	1,83
2003	0,68	3,54	519	0,29	2,59	896	0,96	3,97	1,65
2004	0,86	2,76	320	0,32	1,64	518	1,12	4,03	2,51
2005	2,23	2,50	112	0,35	0,60	170	1,90	2,73	1,01
2006	0,88	4,34	495	0,30	2,51	848	1,83	4,06	1,94
2007	1,17	3,84	329	0,37	1,93	517	1,91	4,56	2,17
2008	1,05	4,58	437	0,38	2,33	615	2,26	3,99	1,87
2009	1,11	3,65	330	0,41	2,16	527	1,49	3,95	1,67
2010	0,93	6,45	696	0,35	3,97	1138	2,48	4,42	1,89
2011	1,54	5,80	377	0,32	1,88	584	3,92	3,98	1,27
2012	2,92	2,61	90	2,58	3,64	141	-1,03	2,35	1,52
2014	1,20	2,05	171	0,42	1,25	295	0,80	1,90	0,75
2015	1,32	3,06	231	0,35	1,36	387	1,70	3,32	1,84
2016	0,98	4,02	410	0,27	1,71	632	2,31	4,44	1,71
2017	1,62	4,37	271	0,37	1,53	410	2,84	4,43	1,69
2018	1,44	6,43	448	0,40	2,81	703	3,62	4,24	2,01
2019	2,80	2,97	106	0,65	1,12	174	1,84	3,74	2,26
2020	0,99	3,61	364	0,37	2,11	567	1,50	4,38	2,00
2021	1,73	4,02	232	0,46	1,50	328	2,52	3,16	1,97
2022	0,72	2,72	377	0,43	2,34	540	0,38	3,74	2,23
2023	2,16	4,16	192	0,45	1,36	303	2,80	3,81	1,58
2024	1,38	5,43	392	0,32	1,98	610	3,45	3,74	2,19
Media	1,36	3,92	330	0,49	2,14	524	1,78	3,75	1,90

10 Ppa (HUELVA)




FIG 12: Variación temporal de deposición de Mg, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.6. Sodio.

TABLA 15: Caracterización Sodio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Traslación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	3,58	9,55	267	2,28	9,43	413	0,13	6,07	6,65
1998	5,35	17,06	319	4,77	20,09	421	-3,03	11,74	10,50
1999	10,24	30,61	299	4,65	21,94	472	8,67	19,31	13,85
2000	6,27	24,53	391	3,96	25,44	643	-0,91	18,12	13,02
2001	4,05	19,66	485	2,73	23,74	869	-4,08	18,38	12,14
2002	7,15	17,51	245	4,48	18,95	423	-1,44	28,50	18,75
2003	3,86	20,03	519	2,68	23,99	896	-3,96	22,49	12,86
2004	2,91	9,30	320	1,62	8,39	518	0,90	22,85	13,75
2005	5,98	6,70	112	2,64	4,50	170	2,21	14,42	7,16
2006	4,43	21,92	495	2,59	21,92	848	0,00	24,17	16,07
2007	3,66	12,03	329	2,44	12,62	517	-0,59	23,14	14,21
2008	3,87	16,93	437	2,49	15,28	615	1,65	19,63	11,01
2009	4,81	15,88	330	3,38	17,81	527	-1,92	22,09	12,27
2010	5,67	39,46	696	3,00	34,10	1138	5,36	24,37	13,76
2011	6,61	24,93	377	1,37	7,98	584	16,95	20,72	5,97
2012	1,71	1,53	90	0,97	1,37	141	0,16	4,35	2,86
2014	5,09	8,71	171	2,46	7,25	295	1,45	6,77	4,55

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II
AÑO 2025

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
2015	5,10	11,80	231	2,57	9,92	387	1,88	15,27	11,59
2016	3,66	15,01	410	2,07	13,08	632	1,93	22,84	11,19
2017	4,49	12,15	271	2,67	10,97	410	1,17	19,35	10,47
2018	6,30	28,21	448	3,03	21,28	703	6,93	22,61	14,29
2019	8,48	8,99	106	4,48	7,78	174	1,22	19,32	13,98
2020	4,09	14,88	364	2,37	13,42	567	1,45	20,09	11,74
2021	4,46	10,35	232	2,31	7,60	328	2,76	12,97	10,32
2022	3,87	14,60	377	2,29	12,38	540	2,22	18,67	11,08
2023	7,78	14,98	192	3,25	9,84	303	5,13	18,93	11,19
2024	6,55	25,70	392	2,30	14,02	610	11,68	18,56	11,05
Media	5,19	16,78	330	2,81	14,63	524	2,15	18,36	11,34




FIG 13: Variación temporal de deposición de Na, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.7. Amonio (nitrógeno en forma de).



TABLA 16: Caracterización Amonio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red. $N(NH_4) \sim 0,777 NH_4$

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,39	1,05	267	1,09	4,50	413	-3,45	1,81	8,19

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II
AÑO 2025

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1998	0,54	1,73	319	2,86	12,02	421	-10,29	2,24	8,36
1999	1,04	3,12	299	0,99	4,65	472	-1,53	2,71	3,66
2000	0,33	1,30	391	1,43	9,20	643	-7,90	2,48	4,26
2001	0,23	1,11	485	0,13	1,11	869	0,00	1,86	1,82
2002	0,90	2,20	245	0,15	0,62	423	1,58	2,43	2,91
2003	0,20	1,02	519	0,24	2,19	896	-1,17	3,06	3,10
2004	0,36	1,16	320	0,84	4,35	518	-3,19	4,12	3,23
2005	0,85	0,95	112	0,48	0,81	170	0,14	2,41	1,80
2006	0,36	1,79	495	0,20	1,71	848	0,08	3,62	3,05
2007	0,49	1,60	329	0,36	1,86	517	-0,27	3,53	3,58
2008	0,31	1,34	437	0,25	1,55	615	-0,21	2,91	2,62
2009	0,32	1,06	330	0,28	1,47	527	-0,41	2,73	1,82
2010	0,21	1,47	696	0,22	2,52	1138	-1,05	3,12	2,09
2011	0,72	2,72	377	0,38	2,25	584	0,48	4,36	3,15
2012	1,17	1,05	90	1,81	2,56	141	-1,51	2,26	2,06
2014	1,17	2,00	171	0,85	2,50	295	-0,50	4,16	3,35
2015	1,32	3,06	231	0,48	1,87	387	1,19	5,30	6,04
2016	1,09	4,45	410	0,32	2,03	632	2,43	5,94	4,26
2017	0,61	1,64	271	0,17	0,71	410	0,93	2,40	1,52
2018	0,29	1,28	448	0,67	4,74	703	-3,45	2,79	2,39
2019	0,35	0,37	106	0,17	0,30	174	0,07	1,60	1,23
2020	0,18	0,67	364	0,10	0,55	567	0,12	1,98	1,81
2021	0,36	0,85	232	0,36	1,18	328	-0,34	2,18	1,71
2022	0,18	0,68	377	0,08	0,42	540	0,26	1,60	2,23
2023	0,54	1,03	192	0,36	1,09	303	-0,06	1,96	1,66
2024	0,35	1,38	392	0,95	5,81	610	-4,42	2,04	2,27
Media	0,55	1,56	330	0,60	2,76	524	-1,20	2,87	3,12






FIG 14: Variación temporal de deposición de amonio, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.8. Cloro.

TABLA 17: Caracterización Cloro. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	9,51	25,28	267	4,74	19,56	413	5,72	10,88	10,93
1998	8,99	28,66	319	6,94	29,22	421	-0,56	19,88	16,27
1999	14,04	41,99	299	7,77	36,67	472	5,32	36,56	23,56
2000	12,14	47,46	391	5,66	36,38	643	11,08	28,62	15,70
2001	8,14	39,16	485	4,79	40,93	869	-1,77	32,37	19,20
2002	13,10	32,09	245	7,37	31,16	423	0,93	44,79	24,88
2003	7,71	40,03	519	5,19	46,42	896	-6,39	39,97	31,89
2004	7,67	24,47	320	6,86	35,41	518	-10,94	47,45	37,43
2005	15,69	17,58	112	10,21	17,36	170	0,22	28,61	21,76
2006	8,82	43,46	495	6,28	53,22	848	-9,76	49,90	41,76
2007	8,10	23,10	329	6,09	27,52	517	-4,42	45,78	37,79
2008	10,44	45,60	437	7,93	48,77	615	-3,17	40,90	30,60
2009	11,26	37,04	330	7,58	39,97	527	-2,93	45,08	25,80
2010	9,52	66,25	696	4,48	50,93	1138	15,32	41,17	21,32
2011	7,92	29,60	377	3,78	21,86	584	7,74	29,44	13,12
2012	8,52	7,62	90	2,35	3,31	141	4,31	11,34	5,87
2014	3,43	5,86	171	1,14	3,36	295	2,50	5,78	2,90
2015	8,34	19,27	231	3,46	13,40	387	5,88	24,25	15,25
2016	7,08	29,04	410	3,61	22,78	632	6,26	37,19	18,03
2017	7,38	19,96	271	4,12	16,89	410	3,07	29,16	15,38
2018	11,45	51,25	448	4,48	31,47	703	19,78	40,34	21,30
2019	13,55	14,38	106	6,32	10,96	174	3,42	29,98	18,87
2020	8,70	31,66	364	4,40	24,95	567	6,72	38,79	22,86
2021	9,95	23,10	232	4,14	13,59	328	9,51	23,04	15,99
2022	7,69	29,01	377	3,80	20,52	540	8,49	32,15	16,37
2023	15,01	28,88	192	5,96	18,07	303	10,80	31,63	16,59
2024	13,71	53,78	392	4,27	26,02	610	27,76	34,07	18,11
Media	9,87	31,69	330	5,29	27,43	524	4,25	32,56	20,72

10 Ppa (HUELVA)




FIG 15: Variación temporal de deposición de Cl, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.9. Nitratos (nitrógeno en forma de).

TABLA 18: Caracterización Nitratos. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red. N(NO3) ~ 0,226 NO3

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,40	1,07	267	0,32	1,33	413	-0,26	2,24	2,13
1998	0,62	1,99	319	0,37	1,57	421	0,42	3,67	2,27
1999	1,12	3,34	299	0,33	1,54	472	1,80	4,43	2,94
2000	0,69	2,70	391	0,31	1,98	643	0,72	3,79	2,38
2001	0,52	2,54	485	0,21	1,80	869	0,74	3,51	2,09
2002	0,98	2,41	245	0,23	0,97	423	1,44	4,15	2,84
2003	0,40	2,06	519	0,22	1,94	896	0,12	5,39	2,74
2004	1,09	3,49	320	0,43	2,20	518	1,29	6,93	3,28
2005	2,50	2,80	112	0,58	0,98	170	1,82	4,31	1,83
2006	0,67	3,31	495	0,21	1,81	848	1,50	5,54	2,75
2007	1,08	3,54	329	0,29	1,49	517	2,05	5,06	2,96
2008	1,26	5,50	437	0,58	3,54	615	1,96	4,72	3,38
2009	0,72	2,36	330	0,27	1,42	527	0,94	3,87	1,87
2010	0,38	1,42	696	0,18	2,00	1138	-0,58	1,87	2,37
2011	1,62	6,11	377	0,74	4,30	584	1,80	7,76	4,61
2012	1,02	0,91	90	0,42	0,59	141	0,32	1,65	0,99
2014	1,26	2,15	171	0,83	2,45	295	-0,30	2,54	1,43

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II

AÑO 2025

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
2015	0,94	2,18	231	0,27	1,05	387	1,13	3,25	2,17
2016	0,65	2,65	410	0,17	1,10	632	1,55	3,58	1,83
2017	0,89	2,42	271	0,19	0,77	410	1,65	3,32	1,74
2018	0,62	2,79	448	0,20	1,41	703	1,38	3,41	2,08
2019	1,43	1,52	106	0,29	0,50	174	1,02	2,46	1,61
2020	0,61	2,22	364	0,08	0,46	567	1,76	2,02	1,64
2021	1,15	2,66	232	0,21	0,68	328	1,98	2,15	1,43
2022	0,50	1,87	377	0,16	0,87	540	1,01	2,09	1,49
2023	1,40	2,69	192	0,28	0,85	303	1,84	2,00	1,29
2024	0,66	2,61	392	0,16	1,00	610	1,61	2,12	1,45
Media	0,93	2,64	330	0,32	1,50	524	1,14	3,62	2,21




FIG 16: Variación temporal de deposición de nitratos, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.10. Sulfatos (azufre en forma de).

TABLA 19: Caracterización Sulfatos. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red. S(SO4) ~ 0,333 SO4



Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997	0,99	2,64	267	0,68	2,83	413	-0,19	3,00	3,70

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II

AÑO 2025

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1998	1,90	6,05	319	1,30	5,46	421	0,60	5,81	5,79
1999	2,28	6,83	299	1,19	5,62	472	1,21	7,17	6,35
2000	1,45	5,68	391	0,89	5,74	643	-0,06	6,42	4,57
2001	1,21	5,88	485	0,53	4,59	869	1,30	5,68	4,11
2002	2,22	5,43	245	0,96	4,05	423	1,38	7,73	6,07
2003	0,90	4,68	519	0,53	4,74	896	-0,06	6,85	4,80
2004	2,24	7,16	320	1,04	5,38	518	1,79	8,72	5,84
2005	2,90	3,24	112	1,05	1,78	170	1,46	4,69	3,12
2006	1,32	6,56	495	0,57	4,81	848	1,75	6,80	4,69
2007	1,39	4,57	329	0,58	3,01	517	1,55	7,24	5,12
2008	0,61	2,68	437	0,21	1,29	615	1,39	4,49	2,61
2009	1,27	4,18	330	0,72	3,80	527	0,38	4,67	3,32
2010	0,90	6,29	696	0,42	4,82	1138	1,47	4,27	2,88
2011	2,70	10,17	377	1,11	6,49	584	3,68	5,93	4,57
2012	2,20	1,97	90	0,93	1,31	141	0,66	1,84	1,35
2014	1,59	2,71	171	0,60	1,77	295	0,95	2,14	2,00
2015	1,09	2,51	231	0,55	2,14	387	0,37	3,56	2,95
2016	0,82	3,35	410	0,45	2,87	632	0,48	4,08	2,76
2017	1,04	2,81	271	0,55	2,25	410	0,56	4,28	2,71
2018	0,95	4,25	448	0,59	4,13	703	0,12	4,28	3,39
2019	2,03	2,15	106	0,79	1,37	174	0,78	3,75	3,13
2020	0,81	2,95	364	0,39	2,20	567	0,75	3,59	3,24
2021	1,49	3,46	232	0,54	1,77	328	1,69	2,60	2,69
2022	0,86	3,25	377	0,44	2,38	540	0,87	3,19	2,67
2023	1,20	2,32	192	0,52	1,56	303	0,75	3,07	2,32
2024	1,00	3,94	392	0,42	2,54	610	1,40	3,13	3,04
Media	1,46	4,36	330	0,69	3,36	524	1,00	4,78	3,70






FIG 17: Variación temporal de deposición de sulfatos, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.11. Alcalinidad ($\mu\text{eq/l}$).

TABLA 20: Caracterización Alcalinidad. Media anual ponderada por volumen, precipitación anual y media de la Red

Año	Trascolución (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
1997			267			413		
1998			319			421		
1999	282,85		299	266,54		472	258,14	255,59
2000	177,13		391	185,04		643	157,24	154,47
2001	84,34		485	42,27		869	76,17	54,64
2002	246,30		245	148,67		423	169,83	139,42
2003	4,61		519	2,45		896	21,95	10,18
2004	90,56		320	57,11		518	109,89	117,44
2005	105,84		112	55,22		170	76,86	45,33
2006	78,11		495	41,35		848	105,76	56,48
2007	69,60		329	26,41		517	59,09	37,75
2008	93,93		437	36,29		615	71,35	40,35
2009	52,55		330	14,16		527	68,62	36,01
2010	75,27		696	43,54		1138	86,39	49,13
2011	104,13		377	48,73		584	75,33	49,79
2012			90			141	19,53	10,46
2014	206,39		171	108,45		295	136,23	120,02
2015	83,84		231	44,77		387	114,70	71,81
2016	99,07		410	25,59		632	108,18	61,70
2017	188,55		271	45,05		410	132,93	56,84
2018	120,48		448	79,44		703	94,72	48,11
2019	98,56		106	70,85		174	101,80	58,32
2020	74,88		364	23,74		567	86,06	49,71
2021	162,66		232	72,67		328	117,39	82,82
2022	130,67		377	65,75		540	105,33	59,15
2023	126,48		192	39,77		303	90,82	45,63
2024	146,96		392	148,58		610	99,50	60,55
Media	120,99		330	70,52		524	101,75	70,87




FIG 18: Variación temporal de la alcalinidad.

5.12. Nitrógeno total.

TABLA 21: Caracterización Nitrógeno total. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia traslación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Traslación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
1997			267			413			
1998			319			421			
1999	2,16	6,47	299	1,31	6,19	472	0,27	7,14	6,59
2000	1,02	4,00	391	1,74	11,18	643	-7,19	6,27	6,64
2001	0,75	3,65	485	0,34	2,91	869	0,74	5,37	3,91
2002	1,88	4,61	245	0,38	1,59	423	3,02	6,58	5,75
2003	0,59	3,08	519	0,46	4,13	896	-1,05	8,44	5,84
2004			320			518			
2005	3,36	3,76	112	1,04	1,77	170	1,99	4,96	2,97
2006	1,00	4,95	495	0,43	3,66	848	1,29	9,06	5,73
2007	1,49	4,90	329	0,54	2,78	517	2,12	8,53	6,45
2008			437			615			
2009			330			527			
2010			696			1138			
2011			377			584			
2012			90			141			
2014			171			295			
2015			231			387			
2016			410			632			

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II
AÑO 2025

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
2017			271			410			
2018			448			703			
2019			106			174			
2020	0,94	3,42	364	0,29	1,66	567	1,77	5,40	4,36
2021	2,10	4,86	232	0,96	3,15	328	1,72	8,83	5,67
2022	1,06	4,01	377	0,43	2,31	540	1,69	6,71	6,31
2023	2,94	5,65	192	0,95	2,88	303	2,77	7,06	4,94
2024	1,52	5,96	392	1,52	9,28	610	-3,31	7,08	5,43
Media	1,60	4,56	330	0,80	4,11	524	0,45	7,03	5,43




FIG 19: Variación temporal de deposición de Ntotal, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.13. Carbono orgánico disuelto – DOC (mg/l).

TABLA 22: Caracterización Carbono orgánico disuelto. Media anual ponderada por volumen, precipitación anual y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
2020	14,50		364	12,08		567	13,09	7,05
2021	20,67		232	13,82		328	14,46	8,48
2022	10,34		377	5,22		540	11,86	5,70
2023	21,81		192	4,34		303	12,56	3,79

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II
AÑO 2025

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Media Red	
	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Media pond	Deposición (kg/ha)	Precipit. (mm)	Trasc	P.inc
2024	13,59		392	3,18		610	12,14	3,09
Media	16,18		312	7,73		470	12,82	5,62




FIG 20: Variación temporal de DOC.

5.14. Aluminio.

TABLA 23: Caracterización Aluminio. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
2020	0,08	0,29	364	0,02	0,10	567	0,20	0,38	0,25
2021	0,08	0,18	232	0,02	0,06	328	0,13	0,28	0,19
2022	0,01	0,05	377	0,00	0,00	540	0,05	0,05	0,11
2023	0,10	0,20	192	0,01	0,02	303	0,18	0,25	0,08
2024	0,05	0,19	392	0,00	0,02	610	0,17	0,19	0,01
Media	0,07	0,18	312	0,01	0,04	470	0,15	0,23	0,13




FIG 21: Variación temporal de deposición de Al, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.15. Manganeso.

TABLA 24: Caracterización Manganeso. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolación (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
2020	0,01	0,05	364	0,00	0,02	567	0,02	0,21	0,05
2021	0,01	0,02	232	0,01	0,02	328	0,00	0,17	0,04
2022	0,00	0,01	377	0,01	0,07	540	-0,06	0,21	0,05
2023	0,02	0,03	192	0,00	0,01	303	0,02	0,26	0,05
2024	0,01	0,02	392	0,00	0,00	610	0,02	0,20	0,02
Media	0,01	0,03	312	0,01	0,03	470	0,00	0,21	0,04




FIG 22: Variación temporal de deposición de Mn, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.16. Hierro.

TABLA 25: Caracterización Hierro. Media anual ponderada por volumen, deposición anual total, precipitación anual, diferencia trascolación-precipitación incidente y media de la Red

Año	Trascolución (Tr)			Precipitación incidente (Pi)			Difer. TR-PI (kg/ha)	Media Red	
	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)	Med.pd (mg/l)	Depos. (kg/ha)	Precipit. (mm)		Trasc (kg/ha)	P.inc (kg/ha)
2020	0,02	0,09	364	0,01	0,04	567	0,06	0,15	0,08
2021	0,02	0,06	232	0,01	0,04	328	0,02	0,11	0,14
2022	0,02	0,06	377	0,01	0,07	540	-0,01	0,12	0,06
2023	0,02	0,05	192	0,00	0,01	303	0,03	0,13	0,04
2024	0,02	0,07	392	0,00	0,00	610	0,07	0,08	0,01
Media	0,02	0,07	312	0,01	0,03	470	0,03	0,12	0,07




FIG 23: Variación temporal de deposición de Fe, diferencia TR-PI, distribución anual de la deposición por trimestres

5.17. Interpretación de resultados.

En cuanto a la deposición atmosférica y por lo que se refiere a la parcela 10Ppa, cabe destacar:

Aunque se ha mencionado en apartados anteriores, debe tenerse en cuenta que el incendio experimentado durante el mes de junio de 2017 ha podido influir en los resultados de deposición correspondientes.

Se observa un comportamiento muy estable del valor del **pH**, que tiende a situarse en el entorno de 6, con valores ligeramente superiores en la trascolación y un ligero incremento a lo largo del último año, registrándose algunas precipitaciones ácidas a campo abierto a lo largo del periodo 2006-2009, 2012 y 2017-2021. El valor de la intercepción debida a la cubierta arbórea se sitúa en el 36 %. En la presente revisión se obtiene una precipitación de 600 mm tras un año muy seco previo. En este sentido cabe hacer constar un comportamiento de la precipitación en diente de sierra, de forma que a un año seco sucede uno más húmedo y que se correspondería con la irregularidad propia del clima mediterráneo.

Por lo que se refiere a la **conductividad** se observa un marcado descenso durante el último año, sobre todo por lo que se refiere a la trascolación, que continúa situándose por encima de los valores medios de la Red en ambas vías de entrada al ecosistema, posiblemente debido a la cercanía al mar de la parcela, lo que supone un mayor aporte de electrolitos, y siempre mayores en los resultados habidos bajo cubierta por el aporte de la deposición seca. El comportamiento del parámetro parece seguir la misma tendencia que la precipitación, sucediéndose valores más altos en años secos y valores más bajos en los años húmedos, posiblemente debido a una mayor dilución de las muestras obtenidas.

En cuanto al **potasio**, se incrementa hasta valores próximos a los 15 kg/ha en trascolación y de forma muy apreciable a campo abierto, en que con cerca de 4 kg/ha se alcanza el mayor valor desde el máximo local de la serie de 2011. Las considerables diferencias entre los aportes bajo cubierta y a campo abierto indicarían una influencia importante de la deposición seca. Los mayores aportes se han producido a lo largo del otoño, mientras que durante la pasada revisión han tenido lugar en invierno, coincidiendo con la época de mayores precipitaciones en la parcela.

El **calcio** presenta por lo general tasas inferiores a las medias de la Red, entre los 5-10 kg/ha en ambas vías, incrementándose apreciablemente durante el último año en que se han superado los 10 kg/ha en, superándose el episodio valle que venía observándose desde el máximo local de 2019 en lo que supone uno de los años de más aporte desde el máximo de la serie en 2008. No hay una prevalencia clara entre las dos vías de entrada al sistema, oscilando entre trascolación y precipitación incidente casi de forma cíclica, si bien en la última parte de la serie tienden a ser mayores las deposiciones bajo cubierta. Los mayores aportes, al igual que otros solutos, han tendido a producirse a lo largo del otoño, si bien durante el último año se han producido durante el primer trimestre del año, en coincidencia con la época de mayores lluvias.

Por lo que respecta al **magnesio**, se incrementa apreciablemente respecto a la revisión del año anterior, sobre todo por lo que respecta a las deposiciones bajo cubierta, que con tasas superiores a 5 kg/ha, alcanza uno de los valores más altos de la serie, que en términos generales ha venido moviéndose en el entorno de 2-4 kg/ha, superando incluso el depósito medio de la red. Como en prácticamente todos los casos, las tasas bajo cubierta son superiores a las obtenidas en campo abierto, influido por el fenómeno de la deposición seca. Habitualmente los mayores aportes han tendido a concentrarse en el otoño, mientras que en el último año y relacionado con un mayor aporte de lluvia, destaca el depósito del primer trimestre.

El **sodio**, elemento procedente en gran parte del aporte de sal marina en una parcela situada a corta distancia de la costa, se incrementa también de forma significativa hasta superar los 25 kg/ha en trascolación, lo que supone una de las mayores tasas de la serie, mientras que el aporte a campo abierto se incrementa también si bien de forma más tenue. Se advierten también mayores valores en los primeros años que van atenuándose con el tiempo. El aporte bajo cubierta ha resultado ser superior al obtenido a cielo abierto en casi todos los casos, posiblemente debido al comportamiento de la deposición seca. Los mayores aportes han tendido a producirse a lo largo del otoño-invierno, influido por el régimen local de precipitaciones.

El **amonio** presenta tasas considerablemente bajas y estables a lo largo del tiempo, en torno a 2 kg/ha, con la excepción del trienio 1998-2000, experimentando un notable incremento durante el último año por lo que se refiere a la deposición a campo abierto, próxima a 6 kg/ha, en lo que supone uno de los mayores valores de la serie, muy por encima del valor medio de la red. La diferencia entre el depósito en las dos vías de acceso son más tenues que en otros solutos, si bien parece predominar el aporte de la precipitación incidente. Como en otros compuestos se advierte un mayor aporte a lo largo del otoño-invierno.

Por lo que respecta al **cloro**, muy afectado también por la influencia de la sal marina, se registran depósitos generalmente superiores a la media de la Red si bien esta diferencia va atenuándose a lo largo del último tramo de la serie, y al igual que el sodio, experimenta un notable incremento en el aporte por trascolación que con cerca de 50 kg/ha alcanza uno de los valores más altos, mientras que a campo abierto las tasas se incrementan también aunque de forma no tan llamativa, rompiendo la fase de meseta 2020-2024 en que se obtuvieron valores más homogéneos. Como en otras parcelas el depósito de cloro es considerablemente mayor al de sodio, en una relación de 2,0. El aporte bajo cubierta tiende a superar al obtenido a cielo abierto a lo largo del último tramo de la serie. Las mayores tasas tienden a obtenerse a lo largo del invierno y el otoño, especialmente durante el último año.

Las tasas de deposición de **nitratos** son en general inferiores a la media de la Red, con máximos locales en 2008 y 2011, en tasas comparativamente bajas sin que lleguen a superarse por lo general los 3 kg/ha y un comportamiento muy estable a lo largo de los últimos años. Los depósitos bajo el arbolado son

por regla general, superiores a los obtenidos bajo cubierta, debido a los efectos de la deposición seca. Por regla general, los mayores aportes se han producido a lo largo del otoño.

En referencia a los **sulfatos**, se advierte un comportamiento bastante estable en los últimos años, con tasas en el entorno de 2-4 kg/ha incrementándose apreciablemente durante la última revisión, en que casi se duplican los valores del año previo. Destaca también, al igual que en otros solutos, depósitos mayores durante los primeros años que han ido atenuándose hacia el final, lejos de los máximos de 2010-2011 en que llegaron a superarse los 10 kg/ha bajo cubierta. Al igual que en el caso anterior y por idénticos motivos, se registran mayores aportes bajo cubierta que a campo abierto. Durante el último año los mayores aportes se han producido durante el invierno.

Por lo que respecta a la **alcalinidad**, se advierten en general valores superiores a las medias de la Red, mayores bajo cubierta arbórea, con una tendencia progresivamente descendente desde los valores más altos habidos al comienzo de la serie histórica, por encima de 150 µeq/l, picos episódicos en 2014, 2017 y 2021 y un nuevo incremento durante el último año sobre todo por lo que se refiere a las muestras tomadas a campo abierto, que alcanzan uno de los mayores valores de la serie.

A partir de 2020 se retoma el análisis del **nitrógeno total**, interrumpido en 2007, y que se sitúa en el entorno de los 2-4 kg/ha, con mayores tasas bajo cubierta y en todo caso inferiores a las habidas durante el inicio de la serie, incrementándose considerablemente durante el último año en lo que se refiere a la deposición a campo abierto que alcanza uno de los mayores valores de la serie por encima de los 8 kg/ha mientras que el aporte por trascolación sigue también una tendencia creciente en los últimos años. Se han analizado también el **carbono orgánico disuelto** que se reduce ligeramente durante la última revisión en valores similares a los medios de la red, y **aluminio, manganeso y hierro**, en tasas traza en todos los casos, sin superar 0,3 kg/ha. Durante el último año y por lo que se refiere al aporte a campo abierto, todo el hierro ha caído durante el último trimestre del año y el depósito de manganeso ha sido despreciable.

En cuanto a la distribución anual de la deposición, se advierte en general que los mayores aportes se dan en otoño-invierno para todos los solutos, aspecto que posiblemente esté relacionado con el patrón de lluvias de la zona.

6. Calidad del aire. Inmisión.

Además del aporte de un determinado componente al ecosistema forestal, vía deposición seca/húmeda evaluada en el apartado anterior, en la Red Europea de Nivel II se mide desde 2000 la concentración en el aire de determinados contaminantes, lo que se conoce con el nombre de inmisión. Normativamente y en España se analiza la concentración de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, amonio (expresados en µg/m³) y ozono (expresado en ppb).

La medición se hace a través de dosímetros pasivos, dispositivos de muestreo dotados de un compuesto químico diana sensible a los distintos contaminantes con los que va reaccionando y que permite evaluar la concentración en aire de los mismos. En el periodo 2000-2009 el cambio de dispositivos fue quincenal, efectuándose de forma mensual a partir de 2010.

Como valores de referencia para estos parámetros, se han tomado:

TABLA 26: Valores de referencia de calidad del aire mediante dosímetros pasivos

Variable	Descripción	Valores de referencia (*)
SO ₂	Promedio anual. Nivel crítico Mapping Manual ICP-2010 (afección a líquenes)	10 µg/m ³

Variable	Descripción	Valores de referencia (*)
NO ₂	Promedio anual. Nivel crítico Mapping Manual ICP-2010	30 µg/m ³
NH ₃	Promedio Anual. Protección líquenes y briofitos	1 µg/m ³
	Promedio Anual. Protección plantas superiores	2-4 µg/m ³

(*) Seguimiento de la Calidad Ambiental y de los Daños por Contaminación en los Bosques Españoles. Proyecto LIFE 07 ENV/DE/000218 FutMon. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, Fundación CEAM, 2011.

Los principales resultados habidos en la parcela se especifican a continuación.

TABLA 27: Inmisión atmosférica. Concentraciones medias anuales de los distintos contaminantes en la parcela y media de la Red. O₃ 1 ppb ~ 1,96 µg/m³

Año	Parcela				Media Red			
	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NH ₃ (µg/m ³)	O ₃ (ppb)	SO ₂ (µg/m ³)	NO ₂ (µg/m ³)	NH ₃ (µg/m ³)	O ₃ (ppb)
2000	3,80	4,99	5,84	36,10	2,45	2,91	2,49	34,34
2001	4,61	4,03	4,73	39,84	3,01	2,51	2,13	38,48
2002	1,32	1,23	2,56	31,56	0,95	0,75	1,57	32,70
2003	1,64	1,37	3,94	31,54	1,05	1,07	2,87	30,03
2004	1,84	1,39	3,73	24,75	1,47	1,34	2,69	25,36
2005								
2006	1,89	1,52	1,28	27,62	1,41	1,27	1,12	27,74
2007	1,58	1,79	1,34	27,95	1,49	1,45	1,44	27,36
2008	1,57	1,62	1,08	26,90	0,82	1,32	0,93	27,18
2009		4,28	3,14	37,87	1,06	2,89	1,30	36,30
2010	2,64	4,25	1,55	38,32	1,29	3,38	1,00	37,54
2011	2,33				1,50		0,48	
2012	2,21	2,81	0,91	30,12	1,60	3,25	0,85	38,79
2014	1,95	3,95	1,12	26,22	1,44	3,35	1,11	29,51
2015	2,10	4,16	1,25	24,27	1,32	3,73	1,24	26,27
2016	1,68	4,17	1,37	29,52	1,12	3,37	1,28	28,68
2017	1,43	3,82	1,76	28,83	1,00	3,57	1,47	30,55
2018	1,77	3,36	1,67	24,66	1,32	3,02	1,85	27,00
2019	1,71	3,70	1,71	21,93	1,11	2,98	1,85	24,94
2020	1,12	3,46	1,94	20,40	0,73	2,73	1,98	23,42
2021	1,35	3,20	1,38	22,82	0,76	2,63	1,47	25,19
2022	1,10	3,78	1,63	18,59	0,68	2,88	1,75	21,13
2023	0,69	4,64	1,89	22,00	0,50	2,58	2,06	22,45
2024	1,14	2,79	1,59	21,73	0,94	2,35	1,60	22,14
2025	1,24	2,01	1,22	36,12	0,80	1,81	1,25	36,99
Media	1,86	3,14	2,11	28,25	1,24	2,48	1,57	29,33




FIG 24: Variación temporal de inmisión por dosímetros

Como puede verse en las gráficas anteriores, los valores de inmisión en la parcela son superiores a los habidos en el conjunto de la Red, resultando el amoníaco el contaminante más representado al comienzo de la serie histórica para ser reemplazado después por los **óxidos de nitrógeno** como compuesto más abundante y que se reduce apreciablemente hasta uno de los valores más bajos de la serie tras el máximo local de 2023 en que se llegaron a superar los 4 µg/m³. Se advierte una reducción, más matizada, en el caso del **amoníaco**, el otro compuesto de naturaleza nitrogenada que se sitúa también en valores comparativamente bajos. Como suele ser habitual, y a excepción del umbral de protección de los líquenes, no se han superado los umbrales de referencia antedichos, si bien durante los primeros años fue habitual que se alcanzara incluso el umbral correspondiente a las plantas superiores. Los niveles de **ozono** experimentan un considerable incremento, al igual que en el resto de las parcelas de la red, interrumpiendo la tendencia descendente que se venía observando años atrás y alcanzando uno de los valores más altos de la serie, por encima de 35 ppb. Los **óxidos de azufre** se incrementan también ligeramente durante los dos últimos años tras el mínimo de 2023 en que no se superó el umbral de 1 µg/m³.

7. Análisis foliar.

El objetivo del análisis foliar es, en concordancia con las especificaciones de las redes europeas, estimar el estado nutricional del arbolado y el impacto de los contaminantes atmosféricos en los ecosistemas forestales; así como la detección de tendencias temporales y sus patrones geográficos de distribución y con ello contribuir al conocimiento y cuantificación del estado de los bosques en Europa.

7.1. Análisis Macronutrientes.

Los macronutrientes analizados han registrado los siguientes valores:

TABLA 28: Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y comparación con el resto de las 54 parcelas de la Red de Nivel II pobladas con la misma especie y la media de la especie. A partir de 2009-2010 sólo se miden las 14 parcelas instrumentadas.

Año	Parcela	Provincia	Peso seco (g) 1000 acículas	MACRONUTRIENTES (mg/g MS)						C (%)
				N	S	P	Ca	Mg	K	
1995-1996	10 Ppa	Huelva	16,00	8,99	0,83	0,66	1,58	1,89	5,40	
	36 Ppa	Valladolid	33,00	9,82	1,05	0,94	2,89	2,70	6,60	
	<i>P. pinea</i>	Red	24,50	9,41	0,94	0,80	2,24	2,30	6,00	

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II
AÑO 2025

Año	Parcela	Provincia	Peso seco (g) 1000 acículas	MACRONUTRIENTES (mg/g MS)						C (%)
				N	S	P	Ca	Mg	K	
1997-1998	10 Ppa	Huelva								
	36 Ppa	Valladolid								
	<i>P.pinea</i>	Red								
1999-2000	10 Ppa	Huelva	16,00	10,48	1,22	0,70	2,24	2,25	3,82	
	36 Ppa	Valladolid	24,00	10,24	1,01	1,09	1,92	2,09	5,62	
	<i>P.pinea</i>	Red	20,00	10,36	1,12	0,90	2,08	2,17	4,72	
2001-2002	10 Ppa	Huelva	37,00	9,52	1,11	0,64	2,12	1,83	4,10	
	36 Ppa	Valladolid	50,00	10,23	1,21	1,09	2,59	2,64	6,56	
	<i>P.pinea</i>	Red	43,50	9,88	1,16	0,87	2,36	2,24	5,33	
2003-2004	10 Ppa	Huelva	42,00	9,44	1,16	0,74	2,36	2,08	4,64	
	36 Ppa	Valladolid	64,00	11,24	1,20	1,22	2,38	2,90	5,61	
	<i>P.pinea</i>	Red	53,00	10,34	1,18	0,98	2,37	2,49	5,13	
2005-2006	10 Ppa	Huelva	27,00	9,71	1,26	0,75	2,43	2,61	5,16	
	36 Ppa	Valladolid	24,50	11,07	1,16	1,01	1,99	2,42	5,52	
	<i>P.pinea</i>	Red	25,75	10,39	1,21	0,88	2,21	2,51	5,34	
2007-2008	10 Ppa	Huelva	47,00	8,51	1,23	0,51	2,70	2,00	4,88	
	36 Ppa	Valladolid	52,50	11,43	1,06	0,91	2,53	2,02	4,32	
	<i>P.pinea</i>	Red	49,75	9,97	1,14	0,71	2,61	2,01	4,60	
2009-2010	10 Ppa	Huelva	23,20	9,70	1,12	0,59	3,12	2,41	4,18	
	<i>P.pinea</i>	Red	23,50	9,70	1,12	0,59	3,12	2,41	4,18	
2011-2012	10 Ppa	Huelva	32,88	9,43	1,18	0,63	2,60	2,23	4,59	
	<i>P.pinea</i>	Red	32,88	9,43	1,18	0,63	2,60	2,23	4,59	
2013-2014	10 Ppa	Huelva	35,63	9,28	1,10	0,53	3,95	2,41	5,45	50,41
	<i>P.pinea</i>	Red	35,63	9,28	1,10	0,53	3,95	2,41	5,45	50,41
2015-2016	10 Ppa	Huelva	24,40	13,86	1,14	0,64	4,19	2,94	4,66	48,16
	<i>P.pinea</i>	Red	24,40	13,86	1,14	0,64	4,19	2,94	4,66	48,16
2017-2018	10 Ppa	Huelva	42,31	8,94	0,62	0,49	2,74	2,17	4,22	50,29
	<i>P.pinea</i>	Red	42,31	8,94	0,62	0,49	2,74	2,17	4,22	50,29
2019-2020	10 Ppa	Huelva	25,02	6,31	0,65	0,41	3,04	2,07	3,55	50,73
	<i>P.pinea</i>	Red	25,02	6,31	0,65	0,41	3,04	2,07	3,55	50,73
2021-2022	10 Ppa	Huelva	35,95		0,30	0,56	3,15	2,61	5,01	
	<i>P.pinea</i>	Red	35,95		0,30	0,56	3,15	2,61	5,01	
2023-2024	10 Ppa	Huelva	24,60	12,95	0,95	0,75	3,23	2,10	4,86	47,72
	<i>P.pinea</i>	Red	24,60	12,95	0,95	0,75	3,23	2,10	4,86	47,72
2024-2025	10 Ppa	Huelva	36,16	12,46	1,61	0,38	1,55	1,13	2,62	51,69
	<i>P.pinea</i>	Red	36,16	12,46	1,61	0,38	1,55	1,13	2,62	51,69

En rojo, análisis de azufre que superan el valor de referencia para la especie, 1,308 mg/g, lo que indica incidencia de la contaminación atmosférica por compuestos sulfurosos. Fuente: (2001) Peña Martínez, J.M. El Estudio del Impacto de la Contaminación Atmosférica en los Bosques. Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Conservación de la Naturaleza. Serie técnica.




FIG 25: Evolución de macronutrientes (mg/g eje izquierdo) y peso de acículas (g eje derecho) en la parcela a lo largo de las sucesivas campañas.

7.2. Análisis Micronutrientes.

TABLA 29: Análisis foliares por campaña bianual de muestreo para la parcela y comparación con el resto de las 54 parcelas de la Red de Nivel II pobladas con la misma especie y la media de la especie. A partir de 2009-2010 sólo se miden las 14 parcelas instrumentadas.

Año	Parcela	Provincia	MICRONUTRIENTES (µg/g MS)				
			Na	Zn	Mn	Fe	Cu
1995-1996	10 Ppa	Huelva		25,00	177,00	368,00	
	36 Ppa	Valladolid		19,00	234,00	554,00	
	P.pinea	Red		22,00	205,50	461,00	
1997-1998	10 Ppa	Huelva					
	36 Ppa	Valladolid					
	P.pinea	Red					
2013-2014	10 Ppa	Huelva		11,76	190,15	91,36	5,45
	P.pinea	Red		11,76	190,15	91,36	5,45
2015-2016	10 Ppa	Huelva		17,40	161,55	118,40	5,54
	P.pinea	Red		17,40	161,55	118,40	5,54
2017-2018	10 Ppa	Huelva		16,14	84,69	81,65	2,91
	P.pinea	Red		16,14	84,69	81,65	2,91
2019-2020	10 Ppa	Huelva		17,79	89,94	66,88	3,44
	P.pinea	Red		17,79	89,94	66,88	3,44
2021-2022	10 Ppa	Huelva		17,51	73,03	78,82	3,53
	P.pinea	Red		17,51	73,03	78,82	3,53
2023-2024	10 Ppa	Huelva		17,54	80,88	86,38	3,85
	P.pinea	Red		17,54	80,88	86,38	3,85

Año	Parcela	Provincia	MICRONUTRIENTES (µg/g MS)				
			Na	Zn	Mn	Fe	Cu
2024-2025	10 Ppa	Huelva		12,02	33,68	73,39	4,82
	P.pinea	Red		12,02	33,68	73,39	4,82




FIG 26: Evolución de micronutrientes (µg/g) en la parcela a lo largo de las sucesivas campañas

7.3. Interpretación de resultados.

Por lo que respecta a los análisis foliares efectuados en la parcela, cabe concluir:

En primer lugar hay que tener en cuenta que en la parcela 10Ppa no se realizó el análisis foliar en 1997-1998. A la vista de los resultados obtenidos en los análisis de la muestra foliar de la parcela 10Ppa podemos hacer las siguientes observaciones:

El **peso** seco presenta un comportamiento muy errático a lo largo de las campañas de medición, sin una tendencia clara, oscilando entre los 16 y los 47 g/1000 acículas, incrementándose durante la pasada revisión al entorno de los 36 g/1000 acículas. La variable tiene un típico comportamiento en diente de sierra que podría responder a las variaciones de la precipitación entre otros factores, oscilando en los últimos años de forma muy estable entre 25-35 g/1000 acículas.

Respecto a los **macronutrientes**; se advierte una leve reducción de la mayoría de los elementos analizados. Por lo que respecta al **nitrógeno**, el elemento más abundante en el follaje, alcanza uno de los valores más altos de la serie, en el entorno de 13 mg/g tras el mínimo de la campaña 2019-2020 y dando un último periodo próximo al máximo de la serie. El elemento más limitante por su escasez, el **fósforo** se reduce

considerablemente hasta alcanzar el valor más bajo desde el inicio de los análisis al situarse por primera vez por debajo de 0,4 mg/g; mientras que el **azufre** se incrementa apreciablemente hasta alcanzar el máximo histórico y superar por primera vez desde el replanteo el valor de referencia de la especie, lo que indicaría la posible incidencia de contaminación atmosférica por elementos sulfurados. **Calcio, magnesio y potasio** se reducen también de forma significativa hasta alcanzar el valor más bajo de la serie, tal como ha ocurrido con el fósforo. En cuanto al contenido en **carbono** del follaje, evaluado en las últimas campañas, se ha situado ligeramente por encima del 50%.

Los **micronutrientes** se han analizado con menos regularidad y no siempre todos ellos, lo que dificulta abordar su evolución en el tiempo. Se advierte una cierta reducción mantenida en el tiempo desde el inicio de la serie, con un comportamiento general bastante regular. Durante la presente campaña se ha incrementado ligeramente el **cobre**, mientras se reducen **hierro, zinc** y particularmente **manganeso**.

8. Desfronde.

Con periodicidad mensual se ha recogido el desfronde o litterfall en la parcela mediante captadores normalizados que recogen la caída correspondiente a 1 m² de superficie. La muestra así tomada se divide en sus principales componentes (hojas, ramillas de diámetro inferior a 2 cm y otras, que incluyen frutos, líquenes, musgos,...) y se analiza en el laboratorio.

Se presentan a continuación los resultados obtenidos desde 2005; haciéndose la salvedad al igual que en casos anteriores, de que en 2012 se ha muestreado el periodo enero-julio, mientras que en 2014 los análisis corresponden al periodo mayo-diciembre.

8.1. Análisis Macronutrientes.

TABLA 30: Resultados medios del análisis de desfronde en sus distintas fracciones. Aporte anual en kg/ha; porcentaje de carbono y contenido en mg/g de materia seca de nitrógeno, azufre, fósforo, calcio, magnesio y potasio.

Año	Fracción	Peso (kg/ha)	C (%)	N (mg/g)	S (mg/g)	P (mg/g)	Ca (mg/g)	Mg (mg/g)	K (mg/g)
2005	Hojas	3.080	52,44	4,64	1,02	0,32	4,16	2,10	2,85
	Ramillas	30	54,35	3,68	0,82	0,19	4,90	1,15	2,34
	Otras	1.120	52,73	6,57	0,97	0,58	5,59	1,28	2,06
2006	Hojas	3.992	50,68	5,67	1,31	0,30	4,72	2,56	2,88
	Ramillas	395	52,13	5,35	0,88	0,23	6,46	0,87	0,66
	Otras	880	51,12	7,01	0,97	0,37	6,21	1,09	1,32
2007	Hojas	1.850	51,99	5,46	1,01	0,96	3,11	2,81	2,80
	Ramillas	21	54,21	4,16	0,89	2,45	6,32	1,65	1,20
	Otras	1.130	52,32	6,34	1,01	0,66	5,16	2,23	1,54
2008	Hojas	4.670	52,59	6,38	0,76	0,26	4,01	2,35	3,34
	Ramillas	516	53,91	3,90	0,82	0,28	7,22	1,00	1,74
	Otras	1.150	51,97	5,63	1,14	0,35	6,00	1,15	1,67
2009	Hojas	3.540	51,61	4,43	1,08	0,23	4,28	2,34	2,88
	Ramillas	333	53,84	4,42	0,95	0,16	5,00	0,66	0,75
	Otras	1.290	52,65	6,31	0,98	0,33	4,92	1,07	2,07
2010	Hojas	4.810	53,19	5,13	1,04	0,25	3,99	2,23	2,42
	Ramillas	239	54,09	6,84	0,98	0,21	6,91	0,97	0,66
	Otras	1.170	54,18	6,05	0,91	0,27	5,43	1,03	1,38
2011	Hojas	4.238	52,02	5,40	1,05	0,91	3,14	2,91	2,80
	Ramillas	329	53,73	4,76	0,89	0,29	4,92	1,96	1,35
	Otras	1.207	52,55	6,29	0,99	0,56	4,54	2,06	1,69

Año	Fracción	Peso (kg/ha)	C (%)	N (mg/g)	S (mg/g)	P (mg/g)	Ca (mg/g)	Mg (mg/g)	K (mg/g)
2012	Hojas	2.450	52,20	5,23	1,17	0,47	3,78	2,46	2,47
	Ramillas	167	53,90	5,29	0,93	0,22	5,61	1,14	0,95
	Otras	809	52,82	6,29	0,96	0,41	4,76	1,37	2,08
2014	Hojas	1.505	50,00	6,23	0,79	0,22	4,03	2,38	4,34
	Ramillas	139							
	Otras	850							
2015	Hojas	5.404	50,42	4,05	0,94	0,19	4,36	2,92	4,24
	Ramillas	297							
	Otras	925	49,75	6,30	0,72	0,34	5,38	1,06	2,80
2016	Hojas	3.889	50,42	5,96	0,96	0,57	8,60	1,94	3,30
	Ramillas	782							
	Otras	1.377	50,93	5,83	0,90	0,69	9,18	1,02	1,72
2017	Hojas	1.984	50,45	7,19	0,66	0,40	3,41	2,05	3,60
	Ramillas	221							
	Otras	2.733							
2018	Hojas	2.812	50,04	4,76	0,83	0,21	4,28	2,34	2,93
	Ramillas	283							
	Otras	2.250							
2019	Hojas	4.579	49,90	3,82	0,82	0,27	4,26	2,45	4,01
	Ramillas	267							
	Otras	1.314							
2020	Hojas	4.784			0,79	0,89	4,58	2,39	3,54
	Ramillas	798							
	Otras	1.093							
2021	Hojas	1.018			1,00	0,40	3,50	2,67	4,57
	Ramillas	144							
	Otras	852							
2022	Hojas	5.361	50,65	5,48	1,48	0,28	4,63	2,54	3,82
	Ramillas	696							
	Otras	1.165							
2023	Hojas	3.615	47,12	6,58	0,82	0,35	4,05	2,75	3,94
	Ramillas	2.120							
	Otras	1.499							
2024	Hojas	2.872	50,88	6,46	0,57	0,28	3,55	2,08	2,72
	Ramillas	122							
	Otras	927							
Media	Hojas	3.498	50,98	5,46	0,95	0,41	4,23	2,44	3,34
	Ramillas	416	53,77	4,80	0,89	0,50	5,92	1,17	1,21
	Otras	1.249	52,10	6,26	0,95	0,46	5,72	1,34	1,83

8.2. Análisis Micronutrientes.

TABLA 30b: Resultados medios del análisis de desfonde en sus distintas fracciones. Contenido en µg/g de materia seca de zinc, manganeso, hierro, cobre, plomo, cobalto, níquel y cadmio (ng/g)

Año	Fracción	Zn (µg/g)	Mn (µg/g)	Fe (µg/g)	Cu (µg/g)	Pb (µg/g)	Co (µg/g)	Ni (µg/g)	Cd (ng/g)
2014	Hojas	12,96	127,77	87,40	3,24				
	Ramillas								
	Otras								

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II
AÑO 2025

Año	Fracción	Zn (µg/g)	Mn (µg/g)	Fe (µg/g)	Cu (µg/g)	Pb (µg/g)	Co (µg/g)	Ni (µg/g)	Cd (ng/g)
2015	Hojas	14,23	155,17	104,42	3,04				
	Ramillas								
	Otras	26,31	39,36	222,58	10,83				
2016	Hojas	11,30	602,72	219,67	4,06				
	Ramillas								
	Otras	33,96	107,14	1210,69	5,40				
2017	Hojas	17,52	94,78	151,37	4,35				
	Ramillas								
	Otras								
2018	Hojas	23,72	117,80	159,91	8,11				
	Ramillas								
	Otras								
2019	Hojas	17,49	127,72	99,81	4,16				
	Ramillas								
	Otras								
2020	Hojas	17,76	145,86	127,10	4,08	1,28	0,31	0,99	33,69
	Ramillas								
	Otras								
2021	Hojas	16,88	100,38	172,62	4,77				
	Ramillas								
	Otras								
2022	Hojas	19,65	115,02	271,92	4,25				
	Ramillas								
	Otras								
2023	Hojas	20,27	123,49	197,71	4,50				
	Ramillas								
	Otras								
2024	Hojas	13,42	91,94	127,00	3,43				
	Ramillas								
	Otras								
Media	Hojas	16,83	163,88	156,27	4,36	1,28	0,31	0,99	33,69
	Ramillas								
	Otras	30,14	73,25	716,64	8,12				




FIG 27: Fracciones de desfronde o litterfall. Serie histórica

Puede verse, con carácter general, cómo el desfronde se sitúa en torno a los 4.000-6.000 kg/ha con un comportamiento en general errático o en diente de sierra, en el que se suceden años de muy bajo aporte con otros de incremento considerable. Tras un periodo 2022-2023 en el que la variable se ha situado próxima a 7.000 kg/ha, se reduce durante la última revisión a uno de los valores más bajos de la serie, destacando la disminución de la fracción leñosa. Los considerables aportes correspondientes a la fracción foliar podrían explicarse también por la ya mencionada presencia endémica de *Thyriopsis halepensis* que causan la pérdida de las acículas de mayor edad en primavera. Con un contenido del desfronde total en carbono que supera el 50%, indica la capacidad de fijación de CO₂ atmosférico del follaje.

9. Fenología.

La fenología estudia la relación entre los fenómenos climáticos y las características morfológicas del desarrollo anual de los vegetales. Tras las observaciones de series anuales suficientemente representativas, puede obtenerse una valiosa información sobre la respuesta de la vegetación frente a variaciones climáticas, acrecentar el papel de las especies forestales como bioindicadoras y explicar el estado actual de la vegetación. El conocimiento de las fases fenológicas del arbolado es también una importante herramienta de gestión fitosanitaria de las masas forestales, pues el ciclo biológico y la capacidad de daño de buena parte de las plagas forestales van ligadas al desarrollo de una determinada fase, particularmente en el caso de los insectos defoliadores. Los cambios fenológicos en la vegetación juegan además un importante papel en la modelación del paisaje.

La evaluación fenológica se hace sobre 20 árboles de la parcela, seleccionando de entre aquellos de las clases dominante o codominante y preferentemente con buena visibilidad de copa; siempre desde una

posición fija para evitar sesgos de observación; quincenalmente desde 1999 hasta 2010 y de forma mensual a partir de entonces.

La evaluación de las distintas fases fenológicas ha experimentado sucesivos cambios metodológicos a lo largo de la serie histórica de estudio, resultando de entre ellas, las más significativas y coherentes la aparición de hoja y la floración; siempre haciendo la salvedad de que se ha considerado que una fase comenzaba cuando lo hacía el 50% de la población muestra.

Se presentan a continuación y para las fases mencionadas, los valores históricos obtenidos en la parcela 10Ppa, de entre ellos el comienzo y fin de fase; su duración o amplitud; el número de días transcurrido entre el 1 de enero y la fecha de inicio de la fase, y –como esbozo de la influencia de la temperatura en el fenómeno- los días-grado transcurridos desde el 1 de enero (periodo de parada vegetativa) y el comienzo de la fase, obtenido de la estación meteorológica instalada en la parcela.

TABLA 31: Resultados de la evaluación fenológica. Comienzo, final y amplitud de la fase. Días desde el 1 de enero hasta el comienzo de fase. Temperatura acumulada (grados-día) hasta el inicio de fase.

Año	Aparición Hoja/Acícula $\geq 50\%$ Población					Floración $\geq 50\%$ Población				
	Fecha Inicio	Fecha Final	Durac.	Días desde 01/01	Temp. Acum. (°Cdía)	Fecha Inicio	Fecha Final	Durac.	Días desde 01/01	Temp. Acum. (°Cdía)
1999	30/04/99	18/08/99	110	119	1411	15/04/99	06/07/99	82	104	1196
2000	29/03/00	28/06/00	91	88	1017					
2001	03/04/01	29/05/01	56	92	1116					
2002	12/03/02	28/05/02	77	70	838					
2003	01/04/03	03/06/03	63	90	1040					
2004	27/04/04	29/06/04	63	117	1416	16/03/04	27/04/04	42	75	830
2005	12/07/05	30/08/05	49	192	2960	10/05/05	31/05/05	21	129	1568
2006	02/05/06	27/06/06	56	121	1662					
2007	24/04/07	13/11/07	203	113	1363	27/03/07	29/05/07	63	85	972
2008	07/05/08	04/11/08	181	127	1742	07/05/08	20/05/08	13	127	1742
2009	20/05/09	07/07/09	48	139	1812	05/05/09	20/05/09	15	124	1543
2010	27/04/10	25/05/10	28	116	1525	27/04/10	11/05/10	14	116	1525
2011	24/05/11	28/06/11	35	143	2137	26/04/11	24/05/11	28	115	1603
2012	29/05/12	26/06/12	28	149	1880	29/05/12	26/06/12	28	149	1880
2014	22/04/14	24/06/14	63	111	1505	22/04/14	27/05/14	35	111	1505
2015	28/04/15	28/07/15	91	117	1467	28/04/15	26/05/15	28	117	1467
2016	26/04/16	07/06/16	42	116	1221	26/04/16	07/06/16	42	116	1221
2017	25/04/17	28/06/17	64	114	1584	25/04/17	30/05/17	35	114	1584
2018	29/05/18	25/07/18	57	148	2000	24/04/18	03/07/18	70	113	1391
2019	23/04/19	24/07/19	92	112	1448	19/03/19	03/06/19	76	77	960
2020	n.d	n.d				n.d	n.d			
2021	26/04/21	29/06/21	64	115	1608	26/04/21	27/05/21	31	115	1608
2022	31/03/22	06/05/22	97	89	1018	26/04/22	19/05/22	23	115	1384
2023	25/04/23	30/05/23	63	114	1485	25/04/23	30/05/23	35	114	1485
2024	04/04/24	03/06/24	60	94	1285	25/04/24	03/06/24	39	115	1664
2025	23/04/25	01/07/25	69	112	1519	23/04/25	03/06/25	41	112	1519
Media			74	117	1522			38	112	1432




FIG 28: Fases fenológicas. Días desde 1 de enero hasta comienzo de fase.

Como puede verse en los gráficos anteriores, la floración precede en la mayoría de los casos a la aparición de las acículas de la nueva metida, registrándose un retraso en 2005, 2012 y 2018; y concentrándose la actividad vegetativa en marzo-abril, con un adelantamiento respecto a estaciones más septentrionales. Durante el último año la brotación y floración se han advertido de forma simultánea en torno a finales de abril.



FIG 29: Brotación (marzo) y elongación acícula (abril)

10. Cintas diamétricas.

Como se ha indicado anteriormente, las parcelas van dotadas de dendrómetros en continuo, 5 instalados en 1999 ampliados a 15 en 2010, de los que se ha tomado la medida de forma quincenal hasta 2009 y mensualmente a partir de 2010.

Para cada una de las cintas instaladas y año de observación se ha obtenido el crecimiento medio, mediante diferencia entre los valores máximos y mínimos anuales –expresado en datos absolutos y en porcentaje sobre el diámetro mínimo- junto con la oscilación o diferencia entre el diámetro en enero y diciembre de cada año, en idénticos términos que el parámetro anterior; y que no tiene necesariamente que coincidir, debido a movimientos de expansión y contracción del tronco ligados al flujo o parón de la savia.

TABLA 32: Valor medio dendrómetros. Crecimiento medio: diferencia en cm y porcentaje entre el máximo y mínimo del año. Oscilación media: diferencia y porcentaje entre los valores de enero y diciembre (o comienzo/fin de año en años incompletos)

AÑO	Crecimiento medio (cm)	Crecimiento medio (%)	Oscilación media (cm)	Oscilación media (%)
1999	0,00	0,00	0,00	0,00
2000	0,10	0,35	0,10	0,32
2001	0,31	1,14	0,31	1,14
2002	0,36	1,38	0,36	1,31
2003	0,31	1,13	0,31	1,01
2004	0,40	1,42	0,40	1,33
2005	0,09	0,31	0,09	0,26
2006	0,37	1,29	0,37	1,29
2007	0,40	1,51	0,40	0,82
2008	0,30	1,04	0,30	0,94
2009	0,33	1,18	0,33	-0,51
2010	0,23	0,83	0,23	0,31
2011	0,35	1,26	0,35	1,23
2012	0,20	0,71	0,20	0,67
2014	0,19	0,66	0,19	0,64
2015	0,14	0,50	0,14	0,45
2016	0,23	0,79	0,23	0,64
2017	0,15	0,52	0,15	0,39
2018	0,41	1,39	0,41	1,33

AÑO	Crecimiento medio (cm)	Crecimiento medio (%)	Oscilación media (cm)	Oscilación media (%)
2019	0,18	0,62	0,18	0,22
2020	0,20	0,65	0,20	0,45
2021	0,21	0,70	0,21	0,50
2022	0,24	0,78	0,24	0,76
2023	0,22	0,70	0,22	-0,29
2024	0,20	0,64	0,20	0,59
2025	0,28	0,90	0,28	0,88
Media	0,25	0,86	0,25	0,64




FIG 30: Crecimiento diametral anual y porcentaje sobre el inicio. Crecimientos mensuales dendrómetros y media parcela

Como puede verse en el gráfico anterior, el crecimiento diamétrico anual en la parcela considerada ha oscilado, excepción hecha del primer año de evaluación, entre el 1,51% de 2007 y el 0,35% de 2005, situándose por regla general en valores próximos al 1,2% anual a comienzos de la serie para pasar a valores más bajos, en torno al 0,80% en el tramo final de la serie, con la excepción del año 2018. Durante la pasada revisión la variable se ha incrementado ligeramente hasta el 0,90% anual.

11. Meteorología.

Se presenta a continuación un resumen de las principales variables meteorológicas recogidas en la estación de la parcela, de los datos disponibles en el sistema en el momento de la redacción del presente informe. Cabe hacer constar, por lo que se refiere a la meteorología, que los datos correspondientes a 2012 abarcan sólo el periodo enero-julio.

TABLA 33: Parámetros meteorológicos básicos. Precipitación anual. Temperatura media anual, máxima de las máximas, mínima de las mínimas, media de las máximas, media de las mínimas. Radiación solar media. Humedad relativa media. Velocidad del viento media y máxima.

Año	Prec	T med	T MAX	T MIN	T max	T min	Rad med	HR med	V viento med	V viento max
	(mm)	(°C)					(W/m ²)	(%)	(m/s)	
1997	413									
1998	421									
1999	472									

10 Ppa (HUELVA)

RED EUROPEA DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y CONTINUO
DE LOS ECOSISTEMAS FORESTALES – RED DE NIVEL II

AÑO 2025

Año	Prec	T med	T MAX	T MIN	T max	T min	Rad med	HR med	V viento med	V viento max
	(mm)	(°C)					(W/m ²)	(%)	(m/s)	
2000	643	14,4	32,3	-6,7	20,0	9,6	132,8	73,4	3,2	26,8
2001	869	17,0	37,3	1,7	22,0	12,5	181,9	72,6	3,7	25,3
2002	423	14,9	30,1	1,0	20,2	10,4	145,4	79,4	3,1	24,2
2003	896	14,9	30,1	1,0	20,2	10,4	145,4	79,4	3,1	24,2
2004	518	16,5	44,2		23,0	9,7		72,4	2,9	24,2
2005	170	16,8	38,1	-7,5	23,3	9,2		64,4	3,3	41,8
2006	848	17,7	43,0	-7,7	23,1	8,1	219,9	71,0	3,2	21,2
2007	517	15,8	38,4	-2,0	22,1	9,8	196,9	71,0	3,3	
2008	615	16,6	37,4	-0,8	22,8	10,8	204,9	69,4	3,4	32,5
2009	527	17,2	38,3	-4,1	23,7	11,2	205,0	68,7	3,3	28,7
2010	1138	17,2	39,6	-8,3	22,5	9,5	214,2	69,8	3,1	22,7
2011	584	17,6	39,3	-2,0	24,1	11,0	180,0	69,6	6,1	21,1
2012	141	15,8	37,5	-4,1	23,1	9,0	160,7	62,4		8,1
2014	295	17,6	39,1	1,1	24,3	10,9		70,8	3,0	14,7
2015	387	18,1	39,6	-0,2	25,2	11,6	410,7	67,9	2,2	46,3
2016	632	18,0	44,6	-2,7	24,9	11,2	426,8	69,6	3,0	23,5
2017	410	18,3	41,2	-2,0	25,5	10,9	397,0	65,2	3,0	67,0
2018	703	17,2	42,4	-3,0	23,5	10,9	292,7	71,0	3,2	32,8
2019	174	16,9	36,6	-1,1	23,8	10,2	266,8	65,6	3,2	23,1
2020	567	17,4	41,0	-1,5	24,3	10,9	198,6	62,3	2,9	29,8
2021	328	17,9	42,1	-2,5	24,8	11,0	197,2	59,7	3,2	22,0
2022	540	17,6	45,7	-2,1	24,8	10,9	167,8	73,5	2,6	21,6
2023	303	17,7	43,8	-3,7	25,4	10,3	142,8	61,0	2,0	44,1
2024	610	17,6	40,5	-1,3	24,4	11,0	321,5	73,0	2,4	29,5
2025	726	17,8	44,0	-3,4	24,8	11,0	455,3	65,5	2,4	20,8
Media	531	17,0	39,4	-2,6	23,4	10,5	239,3	69,1	3,1	28,2




FIG 31: Principales variables meteorológicas.

Siguiendo la metodología publicada por ICP-Forests, se adjuntan a continuación varios parámetros definitorios de estrés climático, relativos a temperatura y precipitación, si bien cabe hacer constar que no todas las series meteorológicas están disponibles o completas.

TABLA 34: Parámetros de estrés meteorológico. DT: número de días con una temperatura máxima del aire superior a 30°C. DH: número de días con una temperatura máxima del aire inferior a 0°C. PMAX5: precipitación máxima acumulada a lo largo de 5 días durante el invierno (1 de enero a 28 de febrero y 1 de octubre a 31 de diciembre). PPES: días con una precipitación de más de 20 mm durante el periodo vegetativo (1 de mayo a 31 de agosto). NOPREC: número de días seguidos sin precipitación durante el periodo vegetativo (1 de mayo a 31 de agosto).

Año	DT	DH	PMAX5		PPES	NOPREC	
	Días	Días	mm	Intervalo	Días	Días	Intervalo
2000	4	0					
2001	53	0					
2002	1	0	71,1	19/11 a 23/11	0		
2003							
2004	79	0	190,6	20/02 a 24/02	1	55	07/06 a 31/07
2005	73	0	38,0	24/02 a 28/02	1	17	29/07 a 14/08
2006	71	0	79,6	23/10 a 27/10	0	37	26/07 a 31/08
2007	44	0	47,7	09/02 a 13/02	0	68	18/06 a 24/08
2008	67	0	52,8	17/02 a 21/02	0	41	04/06 a 14/07
2009	81	0	152,4	20/12 a 24/12	0	46	06/06 a 21/07
2010	64	0	357,0	05/12 a 09/12	0	26	14/05 a 08/06
2011	92	0	44,0	13/02 a 17/02	0	82	31/05 a 20/08
2012	52	0					
2013							
2014	66	0	102,7	23/11 a 27/11	0	68	25/06 a 31/08
2015	75	0	74,9	30/10 a 03/11	0	29	25/05 a 22/06
2016	0	0	51,0	09/10 a 13/10	0	109	15/05 a 31/08
2017	109	0	29,2	03/11 a 07/11	0	123	01/05 a 31/08
2018	76	0	75,4	18/11 a 22/11	0	37	26/07 a 31/08
2019	66	0	58,6	19/12 a 23/12	0	89	04/06 a 31/08
2020	86	0	54,5	03/11 a 07/11	0	48	05/06 a 22/07
2021	84	0	52,6	05/01 a 09/01	0	30	04/07 a 02/08
2022	85	0	69,1	07/12 a 11/12	0	47	06/05 a 21/06
2023	103	0	52,3	08/02 a 12/02	1	77	16/06 a 31/08
2024	72	0	87,8	29/10 a 02/11	0	33	07/07 a 08/08
2025	100	0	125,5	20/01 a 24/01	0	32	02/07 a 02/08

12. Índice de Área Foliar.

El Índice de Área Foliar (Leaf Area Index o LAI) es un parámetro adimensional que se define como el área total de la superficie superior de las hojas por área de unidad de terreno que se encuentre directamente debajo de la planta. El LAI permite estimar la capacidad fotosintética de la vegetación y ayuda a entender la relación entre acumulación de biomasa y rendimiento bajo condiciones ambientales imperantes en una región determinada.

Su medición se efectúa anualmente en época de máxima foliación (generalmente a lo largo del verano) en todas las parcelas, y adicionalmente en invierno en aquellas pobladas por frondosas, mediante fotografía hemisférica situada en 16 ubicaciones fijas en cada parcela siguiendo una cuadrícula preestablecida, tratada posteriormente mediante software específico. Las evaluaciones han quedado normalizadas a partir de 2014, incluyéndose en el presente informe los datos disponibles a partir de dicha fecha, con la salvedad de haber corregido por un algoritmo más exacto a partir de 2016, de acuerdo con las actualizaciones del manual, a lo que pueden atribuirse parte de las variaciones interanuales.

TABLA 35: Índice de Área Foliar (LAI) por punto de observación y año.

SITIO	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Media
S-01	1,88	1,02	1,82	1,86	2,13	1,66	1,79	1,83	2,16	1,73	1,90	1,97	1,81
S-02	1,67	0,90	1,70	1,62	2,05	1,50	1,66	1,66	2,03	1,52	1,73	1,87	1,66
S-03	1,82	1,00	1,83	2,01	1,90	1,37	1,67	1,59	2,32	1,82	1,90	2,01	1,77
S-04	1,72	0,92	1,62	1,92	1,63	1,65	1,76	1,71	2,21	1,84	1,92	1,78	1,72
S-05	1,63	0,90	1,63	1,78	2,00	1,57	1,70	1,78	2,05	1,72	1,85	1,80	1,70
S-06	1,97	1,10	1,97	1,97	1,79	1,69	1,84	1,98	2,48	2,31	2,25	1,97	1,94
S-07	1,86	1,01	1,91	1,75	1,97	1,85	1,91	1,92	2,26	1,97	2,05	1,97	1,87
S-08	1,82	0,95	1,96	1,67	2,04	1,38	1,69	1,74	3,33	2,02	2,34	1,88	1,90
S-09	1,60	0,93	1,82	1,92	1,93	1,76	1,73	1,79	1,96	1,78	1,84	2,00	1,76
S-10	1,69	0,98	1,71	1,76	2,07	1,88	1,75	1,69	1,87	1,58	1,71	1,67	1,70
S-11	1,58	0,99	1,69	2,10	2,12	1,77	2,01	1,84	2,69	1,71	2,07	1,70	1,85
S-12	1,69	1,01	1,61	1,73	1,91	1,68	1,58	1,96	3,35	1,46	2,22	1,39	1,80
S-13	1,72	1,10	1,80	2,08	1,98	1,64	1,94	2,26	2,42	1,57	2,08	1,55	1,85
S-14	1,73	1,05	1,78	2,14	2,19	1,98	1,74	2,37	3,10	1,79	2,40	1,72	2,00
S-15	1,68	1,19	1,87	1,92	2,68	1,82	1,59	2,59	1,58	1,79	1,98	1,70	1,87
S-16	1,74	1,19	1,77	2,07	1,93	2,10	2,25	3,34	1,86	1,91	2,37	2,22	2,06
Media	1,74	1,02	1,78	1,89	2,02	1,71	1,79	2,00	2,35	1,78	2,04	1,83	1,83




FIG 32: Diagrama de cajas LAI anual.




FIG 33: Fotos hemisféricas para determinación del Índice de Área Foliar.