



Foto: J.F. Mota


Linaria benitoi

Es un endemismo del levante almeriense, localizado entre Mojácar y Carboneras, en las zonas medias y basales de la Sierra de Cabrera. Su extensión de presencia es inferior a los 10 km² y su área de ocupación conocida apenas alcanza los 0,5 km². Vive en laderas sobre suelos silíceos, formando parte de los pastos anuales en el estrato herbáceo de los albardales y matorrales alterados por el pastoreo.

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN FUTURA



Evolución prevista

Actualmente, se está destruyendo su hábitat con rapidez y las poblaciones están fuertemente fragmentadas pero desde el punto de vista climático no se prevén problemas futuros.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 6 (12%)
- área potencial: 48

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	32802 (68338%)	6144 (12800%)	100%	100%
• 2041-2070	20696 (43117%)	8632 (17983%)	100%	100%
• 2071-2100	73114 (152321%)	3694 (7696%)	100%	100%
ECHAM4				
• 2011-2040	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
• 2041-2070	27 (56%)	262 (546%)	0%	100%
• 2071-2100	2576 (5367%)	1501 (3127%)	100%	100%

VULNERABILIDAD



A2


B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.