



Foto: Y. Gil

Narcissus bugei

Es un endemismo ibérico andaluz del que se están describiendo actualmente nuevas poblaciones, más ó menos numerosas, dispersas en el sector subbético (Córdoba y Jaén) y sector rondeño (Sierra de las Nieves, Málaga). Vive en suelos profundos en prados de bosquetes aclarados de tomillares basófilos asociados a cursos de agua, incluso a cultivos de regadío. Su especificidad de hábitat y sensibilidad a sequías le hace especialmente vulnerable ante la acción del ganado o polución de aguas y suelos.

SITUACIÓN FUTURA

CGCM2 ■
 ECHAM4 ■
 CGCM2 y ECHAM4 ■

SITUACIÓN ACTUAL



Evolución prevista

Parece muy grave el pastoreo ovino y caprino. El riesgo de desaparición es alto pero hay posibilidad de gestionar adecuadamente las zonas potenciales para conseguir la adaptación.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 23 (1%)
- área potencial: 2171

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	625 (29%)	2119 (98%)	35%	22%
• 2041-2070	79 (4%)	1388 (64%)	4%	13%
• 2071-2100	131 (6%)	1 (0%)	0%	0%
ECHAM4				
• 2011-2040	240 (11%)	239 (11%)	26%	26%
• 2041-2070	60 (3%)	75 (4%)	9%	4%
• 2071-2100	38 (2%)	58 (3%)	4%	4%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.