



Foto: Willow (Wikimedia Commons)


Salix caprea

Este sauce de porte arbustivo o a veces aparece en claros de bosques, bordes de riberas y zonas húmedas. En España es de distribución norteña, desde Asturias hasta Cataluña, llegando hasta los 2000 m de altura. Se asocia con temperaturas máximas y mínimas estivales frescas.

SITUACIÓN FUTURA

CGCM2 ■
 ECHAM4 ■
 CGCM2 y ECHAM4 ■

SITUACIÓN ACTUAL



Evolución prevista

La reducción de hábitat es importante según los modelos, especialmente a final de siglo, donde afecta más a los extremos de su distribución. Esta especie puede ser protegida dentro de un plan general de bosques riparios o con los planes específicos de los bosques donde aparece como prebosque u orla.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 541 (3%)
- área potencial: 15204


	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	4290 (28%)	14289 (94%)	17%	61%
• 2041-2070	7533 (50%)	9827 (65%)	31%	40%
• 2071-2100	1577 (10%)	3957 (26%)	7%	16%
ECHAM4				
• 2011-2040	13186 (87%)	10536 (69%)	50%	40%
• 2041-2070	12669 (83%)	11458 (75%)	36%	38%
• 2071-2100	12097 (80%)	3901 (26%)	31%	7%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

1. Protección de espacios actuales.

Generales:

2. Plan de gestión general de formaciones riparias.

Las saucedas pueden estar acogidas a un plan general que se ocupe de todos los bosques riparios.