




Foto: J. Martínez Huelves

Sorbus aria

El mostajo es propio de las orlas forestales de hayedos, robledales, quejigares, bosques mixtos, encinares y abedulares. Aparece en la mitad Norte ibérica entre los 300 y 1900 m en pendientes media o bajas fuera de las zonas más expuestas a la insolación.

SITUACIÓN ACTUAL



■ Presencia
■ Área potencial

SITUACIÓN FUTURA

■ CGCM2
■ ECHAM4
■ CGCM2 y ECHAM4

Evolución prevista

Se prevén reducciones moderadas de la superficie potencial en las zonas actuales, algo más fuertes en los modelos ECHAM4, como es habitual.

Esta especie puede acogerse a los planes de los bosques en los que aparece, sin necesidad de plan específico.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 1277 (1%)
- área potencial: 66595


	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	57998 (87%)	74628 (112%)	77%	84%
• 2041-2070	31328 (47%)	51979 (78%)	64%	72%
• 2071-2100	11177 (17%)	27402 (41%)	32%	41%
ECHAM4				
• 2011-2040	19579 (29%)	12633 (19%)	13%	14%
• 2041-2070	8115 (12%)	6432 (10%)	8%	13%
• 2071-2100	6193 (9%)	5349 (8%)	3%	7%

VULNERABILIDAD





A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

1. Protección de espacios actuales.

Su gestión debe contemplarse en los planes de los bosques en los que aparece.