



Foto: D. Navas


## Veronica tenuifolia subsp. fontqueri

Es un endemismo de alta montaña bética, restringido sólo a algunas cumbres de las sierras de Baza (Granada), las Nieves (Málaga) y Gádor (Almería). Aparece en algunos matorrales espinosos de xerófitos de la alta montaña mediterránea sobre sustratos calizos y calizo-dolomíticos. Sus poblaciones probablemente no superan en conjunto los 1000 individuos.

### SITUACIÓN ACTUAL



### SITUACIÓN FUTURA



### Evolución prevista

No se prevén problemas climáticos futuros, con amplias zonas potenciales superpuestas a las ocupadas actualmente.

### ESTADÍSTICA

#### Superficies actuales (km<sup>2</sup>)

- presencia: 10 (0%)
- área potencial: 1609

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
• 2011-2040	1371 (85%)	5971 (371%)	90%	100%
• 2041-2070	1079 (67%)	4352 (270%)	90%	100%
• 2071-2100	331 (21%)	1282 (80%)	70%	90%
<b>ECHAM4</b>				
• 2011-2040	1154 (72%)	113 (7%)	90%	50%
• 2041-2070	520 (32%)	99 (6%)	80%	50%
• 2071-2100	370 (23%)	14 (1%)	70%	20%

### VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

*Ex situ:*

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

**Planificación y coordinación.**

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.