


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 20 de marzo de 2024


Los modelos consultados prevén la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 20 de marzo. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste, centro, este y norte de la Península, 10-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, 10-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noroeste y noreste peninsular y 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el archipiélago canario. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre casi toda la superficie de la Península y húmedo sobre el centro noroeste y norte peninsular a lo largo del día.

El modelo MONARCH prevé la presencia de masas de aire africano en superficie sobre la Península y las islas Canarias para el día 20 de marzo. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el centro y este de la Península, 5-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste, norte y noreste, y 5-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste y noroeste peninsular y las islas Canarias.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo MONARCH para el día 20 de marzo de 2024 a las 00h y 12h UTC. © Barcelona Dust Regional Center.

El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano en superficie sobre la Península para el día 20 de marzo. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 1-500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste, centro, este, norte y noreste de la Península, 1-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste y 1-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noroeste peninsular.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 20 de marzo de 2024 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPs prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 20 de marzo. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos $20\text{-}80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, sureste, centro, este y norte peninsular y $20\text{-}40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noroeste y noreste de la Península y las islas Canarias.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 20 de marzo de 2024 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.



Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 20 de marzo de 2024 a las 00 h UTC y a las 12 h UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.


Las imágenes de la comparación de modelos proporcionadas por SDS-WAS prevén también la presencia de masas de aire africano sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias para el día 20 de marzo. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos $5\text{-}200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, sureste, centro, este y norte peninsular, $5\text{-}50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noreste de la Península y $5\text{-}20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noroeste peninsular y los archipiélagos balear y canario.




Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (mediana en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) para el día 20 de marzo de 2024 a las 00 h y las 18 h UTC. Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe (SDS-WAS NAMEE)

RC; <http://sds-was.aemet.es>), gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; <http://www.aemet.es/>) y Barcelona Supercomputing Center (BSC, <https://www.bsc.es/>).

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran el transporte de masas de aire africano en altura sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias para el día 20 de marzo, favorecido por las bajas presiones predominantes sobre el Mediterráneo y noroeste del continente africano.




Carga total de polvo (mg/m²) predicha por el modelo SKIRON para el día 20 de marzo de 2024 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 20 de marzo de 2024 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre casi toda la superficie de la Península y húmedo sobre el centro noroeste y norte peninsular a lo largo del día 20 de marzo.



Depósito seco de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 20 de marzo de 2024 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 20 de marzo de 2024 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

Fecha de la predicción: 19 de marzo de 2024

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.