


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 13 de agosto de 2015


Para el día 13 de agosto los modelos prevén la continuación del episodio de intrusión de masas de aire africano que está afectando a la Península y a las islas Canarias. Las concentraciones estimadas de polvo en superficie podrían estar en los rangos 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este y noreste de la Península, y 10-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste. Para las islas Canarias se prevén concentraciones de polvo en el rango 10-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ que se podrían superar en algunas islas. Según el modelo SKIRON, también podría producirse depósito seco de polvo sobre el este de la Península y las islas Canarias, y húmedo sobre el norte, este y noreste peninsular y las islas Canarias.

El modelo BSC-DREAM8b v2.0 prevé la presencia de masas de aire africano a nivel de superficie sobre la Península y las islas Canarias para el día 13 de agosto. Estima concentraciones de polvo en los rangos 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este y noreste de la Península y 10-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste. Para las islas Canarias estima concentraciones de polvo en superficie que podrían superar el rango 10-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo BSC-DREAM8b v2.0 para el día 13 de agosto de 2015 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Barcelona Supercomputing Center.

El modelo NMMB/BSC-Dust prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias. Estima concentraciones de polvo en superficie en el rango 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este y noreste de la península, y 10-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste. Para las islas Canarias este modelo estima concentraciones de polvo en superficie que podrían superar el rango 10-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo NMMB/BSC-Dust para el día 13 de agosto de 2015 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Barcelona Dust Forecast Center.

El modelo SKIRON también prevé la presencia de las masas de aire africano sobre la Península para el día 13 de agosto. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este y noreste de la Península y 10-50 para el sureste. Para las islas Canarias este modelo no coincide con los anteriores y estima concentraciones de polvo por debajo de 10 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 13 de agosto a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPS prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias. Estima concentraciones de polvo en los rangos 20-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste, centro y este de la Península y 20-60 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 13 de agosto de 2015 a las 00:00 UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 13 de agosto de 2015 a las 00:00 UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y de altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON prevén la presencia de las masas de aire africano en altura sobre la Península, las islas Baleares y las Canarias lo largo del día 13 de agosto.




Carga total de polvo (mg/m²) predicha por el modelo SKIRON para el día 13 de agosto de 2015 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura de geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 13 de agosto de 2015 a las 12 UTC. © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON, también podría producirse depósito seco de polvo sobre el este de la Península y las islas Canarias, y húmedo sobre el norte, este y noreste peninsular y las islas Canarias.



Depósito seco de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 13 de agosto de 2015 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 13 de agosto de 2015 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

Fecha de elaboración de la predicción: 12 de agosto de 2015.

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC).

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de trabajos relacionados con el estudio y evaluación de la contaminación atmosférica por material particulado y metales en España”.