


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 16 de junio de 2017


Los modelos prevén la continuación del episodio de intrusión de masas de aire africano que está teniendo lugar sobre la Península y las islas Canarias para el día 16 de junio. Estiman concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, sureste y centro de la Península y 10-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este, noroeste, norte y noreste peninsular y las islas Canarias. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre la totalidad de la Península y las islas Canarias y húmedo sobre el sureste, centro y este peninsular y las islas Canarias a lo largo del día.

El modelo BSC-DREAM8b v2.0 prevé la presencia de masas de aire africano a nivel de superficie sobre la Península y las islas Canarias para el día 16 de junio. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-160 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste y centro de la Península, 10-80 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste y este y 10-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noroeste, norte y noreste peninsular y las islas Canarias.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo BSC-DREAM8b v2.0 para el día 16 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Barcelona Supercomputing Center.

El modelo NMMB/BSC-Dust prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península para el día 16 de junio. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos 10-160 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste peninsular, 10-40 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para zonas del centro y 10-20 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, este, noroeste y noreste.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo NMMB/BSC-Dust para el día 16 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Barcelona Dust Forecast Center.

El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y los archipiélagos balear y canario para el día 16 de junio. Estima concentraciones de polvo en superficie que podrían superar $100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ en zonas del centro de la Península, y en los rangos $1\text{-}100 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste, $1\text{-}50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, este, noroeste y norte, $1\text{-}25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noreste, e inferiores a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Baleares y Canarias.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 16 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPs prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 16 de junio. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos $20\text{-}80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, sureste y centro peninsular y $20\text{-}40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el este, norte y noroeste peninsular y las islas Canarias.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 16 de junio de 2017 a las 00 UTC y a las 12 UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.




Espesor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 16 de junio de 2017 a las 00 UTC y a las 12 UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON muestran la presencia de masas de aire africano en altura sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias.




Carga total de polvo (mg/m^2) predicha por el modelo SKIRON para el día 16 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas ($^{\circ}\text{C}$) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 16 de junio de 2017 a las 12 UTC. © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre la totalidad de la Península y las islas Canarias y húmedo sobre el sureste, centro y este peninsular y las islas Canarias a lo largo del día 16 de junio.



Depósito seco de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 16 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 16 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

Fecha de elaboración de la predicción: 15 de junio de 2017

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC).

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de trabajos relacionados con el estudio y evaluación de la contaminación atmosférica por material particulado y metales en España”.