


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 23 de junio de 2017


Los modelos prevén la continuación del episodio de intrusión de masas de aire africano que está teniendo lugar sobre la Península y las islas Canarias para el día 23 de junio. Estiman concentraciones de polvo en superficie que podrían superar los $40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias y en los rangos $10\text{-}40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sur, centro y norte de la Península y $10\text{-}20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noroeste, este y noreste peninsular. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre casi toda la Península y las islas Canarias y húmedo sobre el noroeste, norte y noreste peninsular a lo largo del día.

El modelo BSC-DREAM8b v2.0 prevé la presencia de masas de aire africano a nivel de superficie sobre la Península y las islas Canarias para el día 23 de junio. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos $10\text{-}160 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias, $10\text{-}80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noroeste de la Península, $10\text{-}40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, sureste, centro, este y norte peninsular y $10\text{-}20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el noreste.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo BSC-DREAM8b v2.0 para el día 23 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Barcelona Supercomputing Center.

El modelo NMMB/BSC-Dust prevé la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 23 de junio. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos $10\text{-}80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias, $10\text{-}40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste peninsular y $10\text{-}20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste y centro.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo NMMB/BSC-Dust para el día 23 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Barcelona Dust Forecast Center.

El modelo SKIRON prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias para el día 23 de junio. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos $1\text{-}50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste de la Península, $1\text{-}25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sureste, centro, este y norte peninsular, e inferiores a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para otras zonas de la Península, las islas Baleares y las islas Canarias.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 23 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

El modelo NAAPs prevé también la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 23 de junio. Estima concentraciones de polvo en superficie en el rango $20\text{-}40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el suroeste, sureste, centro, norte y noreste peninsular y las islas Canarias.




Espeor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 23 de junio de 2017 a las 00 UTC y a las 12 UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.




Espeor óptico de aerosoles a 550 nm (arriba) y concentración de polvo a nivel de superficie (abajo) previstos por el modelo NAAPS para el día 23 de junio de 2017 a las 00 UTC y a las 12 UTC. ©Naval Research Laboratory (NRL), Monterey, CA.

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON muestran la presencia de masas de aire africano en altura sobre la Península, las islas Baleares y las islas Canarias, favorecida anticiclón sobre la Península y el Mediterráneo.




Carga total de polvo (mg/m^2) predicha por el modelo SKIRON para el día 23 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas ($^{\circ}\text{C}$) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 23 de junio de 2017 a las 12 UTC. © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco de polvo sobre casi toda la Península y las islas Canarias y húmedo sobre el noroeste, norte y noreste peninsular a lo largo del día 23 de junio.



Depósito seco de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 23 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 23 de junio de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

Fecha de elaboración de la predicción: 22 de junio de 2017

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC).

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de trabajos relacionados con el estudio y evaluación de la contaminación atmosférica por material particulado y metales en España”.