


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 6 de octubre de 2017


Los modelos prevén la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias para el día 6 de octubre. Estiman concentraciones de polvo en superficie inferiores a $20 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco y húmedo de polvo sobre las islas Canarias a lo largo del día.

El modelo BSC-DREAM8b v2.0 prevé la presencia de masas de aire africano a nivel de superficie sobre las islas Canarias para el día 6 de octubre. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos $10\text{-}20 \mu\text{g}/\text{m}^3$.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo BSC-DREAM8b v2.0 para el día 6 de octubre de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Barcelona Supercomputing Center.

El modelo NMMB/BSC-Dust prevé también la presencia de masas de aire africano a nivel de superficie sobre las islas Canarias para el día 6 de octubre. Estima concentraciones de polvo en superficie en los rangos $10\text{-}20 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Las altas concentraciones de polvo estimadas sobre la cuenca del Ebro estarían relacionadas con procesos de resuspensión local.



Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo NMMB/BSC-Dust para el día 6 de octubre de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Barcelona Dust Forecast Center.


El modelo SKIRON prevé la presencia de masas de aire africano sobre la Península y las islas Canarias para el día 6 de octubre. Estima concentraciones de polvo en el rango $1-25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para las islas Canarias e inferiores a $10 \mu\text{g}/\text{m}^3$ para el sur de la Península.




Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para el día 6 de octubre de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 12 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

Las imágenes del modelo NAAPs no estaban disponibles en el momento de realizar este informe.

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON muestran el transporte de masas de aire africano sobre las islas Canarias, favorecido por las altas presiones situadas sobre el norte de África.




Carga total de polvo (mg/m^2) predicha por el modelo SKIRON para el día 6 de octubre de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para el día 6 de octubre de 2017 a las 12 UTC. © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco y húmedo de polvo sobre las islas Canarias a lo largo del día 6 de octubre.



Depósito seco de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para el día 6 de octubre de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m²) predicho por el modelo SKIRON para el día 6 de octubre de 2017 a las 00 UTC (izquierda) y a las 18 UTC (derecha). © Universidad de Atenas.

 Fecha de elaboración de la predicción: 5 de octubre de 2017

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC).

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Acuerdo de Encomienda de Gestión entre el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de trabajos relacionados con el estudio y evaluación de la contaminación atmosférica por material particulado y metales en España”.