


Predicción de intrusión de masas de aire africano sobre España para el día 21 de enero de 2023


Los modelos consultados prevén la presencia de masas de aire africano sobre la zona de las islas Canarias durante el día 21 de enero y la finalización de este episodio. Estiman concentraciones de polvo en superficie en el rango $10\text{-}50\ \mu\text{g}/\text{m}^3$. Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco y húmedo de polvo sobre el archipiélago a lo largo del día.

El modelo MONARCH prevé la presencia de masas de aire africano en superficie sobre las islas Canarias para los días 21 y 22 de enero. Estima concentraciones de polvo en superficie en el rango $5\text{-}50\ \mu\text{g}/\text{m}^3$.



Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo MONARCH para los días 21 y 22 de enero de 2023 a las 00h y 12h UTC. © Barcelona Dust Regional Center.


El modelo SKIRON prevé la presencia de masas de aire africano en superficie sobre las islas Canarias para el día 21 de enero. Estima concentraciones de polvo en superficie en el rango 1-50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.



Concentración de polvo ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) predicha por el modelo SKIRON para los días 21 y 22 de enero de 2023 a las 00 y 12 UTC © Universidad de Atenas.


La página web del modelo NAAPs no se encontraba disponible en el momento de redactar este informe.

Las imágenes de la comparación de modelos proporcionadas por SDS-WAS prevén la presencia de masas de aire africano sobre las islas Canarias para el día 21 de enero. Estiman concentraciones de polvo en superficie en el rango 5-200 $\mu\text{g}/\text{m}^3$.




Resultados de la comparación de múltiples modelos de predicción de concentración de polvo (mediana en $\mu\text{g}/\text{m}^3$) para los días 21 y 22 de enero de 2023 a las 00 h y las 18 h UTC. Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System Regional Center for Northern Africa, Middle East and Europe (SDS-WAS NAMEE RC; <http://sds-was.aemet.es>), gestionado conjuntamente por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET; <http://www.aemet.es/>) y Barcelona Supercomputing Center (BSC, <https://www.bsc.es/>).

Los mapas de carga total de polvo, así como los de presión a nivel del mar y altura geopotencial a nivel de 850 hPa proporcionados por el modelo SKIRON, muestran el transporte de masas de aire africano sobre las islas Canarias previsto para el día 21 de enero, favorecido por la posición del anticiclón de las Azores, que generó vientos de componente este sobre el archipiélago.




Carga total de polvo (mg/m^2) predicha por el modelo SKIRON para los días 21 y 22 de enero de 2023 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.




Precipitación acumulada (mm) y presión a nivel del mar (hPa) (izquierda) y campo de temperaturas (°C) y de altura geopotencial a 850 hPa (derecha) previsto por el modelo SKIRON para los días 21 y 22 de enero de 2023 a las 12 UTC © Universidad de Atenas.

Según el modelo SKIRON también podría producirse depósito seco y húmedo de polvo sobre las islas Canarias a lo largo del día 21 de enero.



Depósito seco de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para los días 21 y 22 de enero de 2023 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.



Depósito húmedo de polvo (mg/m^2) predicho por el modelo SKIRON para los días 21 y 22 de enero de 2023 a las 00 y 18 UTC © Universidad de Atenas.

Fecha de la predicción: 20 de enero de 2023

Predicción elaborada por Noemí Pérez (IDAEA-CSIC)

Los datos son propiedad de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, del Ministerio para la Transición Ecológica, y han sido obtenidos y se suministran en el marco del “Encargo del Ministerio para la Transición Ecológica a la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la detección de episodios naturales de aportes transfronterizos de partículas y otras fuentes de contaminación de material particulado, y de formación de ozono troposférico”.