



## **B. INFORMACION SOBRE LA PLANTA MODIFICADA GENÉTICAMENTE**

### **1- Identidad de la planta receptora o parental**

- (a) Familia : Poaceae (Gramineae)
- (b) Genero : *Zea*
- (c) Especie : *mays*
- (d) Subespecie (si procede) : ninguna
- (e) Cultivar/línea de reproducción (si procede): variedades experimentales
- (f) Nombre vulgar : maíz

### **2- Descripción de los rasgos y características que se han introducido o modificado, incluidos los genes marcadores y las modificaciones anteriores**

El maíz DAS-Ø15Ø7-1xDAS-59122-7, denominado maíz 1507x59122, es resistente a ciertos insectos lepidópteros, tales como el taladro del maíz (*Ostrinia nubilalis*) y a ciertos insectos coleópteros, tales como el gusano de la raíz (*Diabrotica virgifera virgifera*) y tolerante al glufosinato de amonio. Este maíz se ha obtenido mediante métodos de mejora tradicional entre la descendencia de maíz modificado genéticamente DAS-Ø15Ø7-1 (denominado maíz 1507), que es resistente contra ciertos insectos lepidópteros y tolerante al glufosinato, y de maíz DAS-59122-7 (denominado maíz 59122) que es resistente contra ciertos insectos coleópteros y tolerante al glufosinato. Tolerancia al glufosinato fue introducida como marcador selectivo del proceso de selección en los maíces 1507 y 59122.

### **3- Tipo de modificación genética**

- (a) Inserción de material genético
- ~~(b) Eliminación de material genético~~
- ~~(c) Substitución de una base~~
- ~~(d) Fusión celular~~
- ~~(e) Otro (especifíquese)~~

### **4- En caso de inserción de material genético, indique la fuente y la función prevista de cada fragmento componente de la región que se inserte**

Los genes introducidos en el maíz 1507x59122 son un gen *cry1F* de la bacteria del suelo *Bacillus thuringiensis* var. *aizawai* optimizado para expresión en vegetales, que le confiere resistencia a ciertos insectos Lepidópteros y un gen *pat* de la bacteria del suelo *Streptomyces viridochromogenes* optimizado para expresión en vegetales, introducido como marcador selectivo del proceso de selección, que le confiere tolerancia al herbicida glufosinato de amonio, como en el maíz 1507, y los genes *cry34Ab1* y *cry35Ab1* de la bacteria del suelo *Bacillus thuringiensis* cepa PS149B1 optimizados para expresión en el maíz que le confieren resistencia a ciertos insectos coleópteros, tales como *Diabrotica virgifera virgifera*, y el gen *pat* de la bacteria del suelo *Streptomyces viridochromogenes* optimizado para expresión en vegetales, introducido como marcador selectivo del proceso de selección, que le confiere tolerancia al herbicida glufosinato de amonio, como en el maíz 59122, junto con los componentes necesarios para su expresión:

- El gen *cry1F*, el promotor UBIZM1(2), el terminador ORF25PolyA.
- El gen *pat*, el promotor CaMV35S, el terminador CaMV35S.
- El gen *cry34Ab1*, el promotor UBIZM1(2), el terminador PINII.
- El gen *cry35Ab1*, el promotor de la Peroxidasa, el terminador PINII.
- El gen *pat*, el promotor CaMV35S, el terminador CaMV35S.

**5- En caso de eliminación u otra modificación del material genético, indique la función de las secuencias eliminadas o modificadas**

No es aplicable a este caso.

**6- Descripción resumida de los métodos utilizados en la modificación genética**

No se ha realizado ninguna modificación genética directamente sobre las variedades de maíz 1507x59122: éstas se derivan de métodos de mejora tradicional entre la descendencia de maíces modificados genéticamente 1507 y 59122.

El maíz 1507 fue modificado genéticamente utilizando el método de aceleración de partículas. El maíz 59122 fue modificado genéticamente utilizando el método de transformación por *Agrobacterium*.

**7- Si la planta receptora o parental pertenece a una especie de árboles forestales, describa las vías y la extensión de la diseminación, así como los factores específicos que afecten a ésta**

No es aplicable a este caso.

**C. INFORMACION SOBRE LA LIBERACIÓN EXPERIMENTAL**

**1- Finalidad de la liberación**

La finalidad de la liberación es el ensayo de variedades de maíz modificado genéticamente 1507x59122 para recopilar datos para la Inscripción en el Registro Variedades Comerciales de estas variedades.

**2- Localización geográfica del lugar de la liberación**

La liberación está programada en las siguientes localidades españolas durante el año 2010:

- Andalucía: Dos Hermanas (Sevilla), Los Palacios-Villafranca (Sevilla), Marchena (Sevilla), Alcalá del Río (Sevilla).
- Aragón: Tauste (Zaragoza), Villafranca de Ebro (Zaragoza)-(3 localizaciones), Ejea de los Caballeros (Zaragoza), Nuez de Ebro (Zaragoza)-(2 localizaciones).
- Castilla-La Mancha: La Gineta (Albacete).
- Castilla y León: Corbillos de los Oteros (León), Toral de los Guzmanes (León), Sahagún (León), Chozas de Abajo (León), Villarrabé (Palencia), Olmos de Ojeda (Palencia)-(2 localizaciones), Ribas de Campos (Palencia)-(3 localizaciones), Nava de Roa (Burgos)..

- Extremadura: Villanueva de la Serena (Badajoz), Villar de Rena (Badajoz).
- Galicia: Mesía (La Coruña).

### **3- Área del lugar (m<sup>2</sup>)**

Se podrá sembrar hasta 1000 m<sup>2</sup> de las plantas de maíz modificado genéticamente 1507x59122 objeto de esta solicitud en cada lugar de liberación.

### **4- Datos pertinentes sobre liberaciones anteriores de esa misma PSMG, si los hubiera, específicamente relacionados con las repercusiones potenciales de su liberación en el medio ambiente y la salud humana.**

Ya se han llevado a cabo ensayos de campo en varias localidades de regiones productoras de maíz en América del Norte, América del Sur y Europa, y no se observaron problemas medioambientales en estos ensayos. Las plantas transgénicas han presentado un comportamiento y una apariencia normal en todos los aspectos en los ensayos. Se comportaron como plantas convencionales, excepto por su resistencia a ciertos insectos lepidópteros como el taladro del maíz, y a ciertos insectos coleópteros como el gusano de la raíz o Diabrotica, y tolerancia a las aplicaciones del herbicida glufosinato, caracteres debidos a las modificaciones genéticas.

El maíz 1507x59122 no está regulado en los EE.UU. y Canadá desde 2005, y en Japón desde 2006 y está siendo cultivado desde esos años. No se han registrado efectos adversos.

### **D. RESUMEN DEL IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL DE LA LIBERACIÓN DE LA PSMG DE CONFORMIDAD CON EL APARTADO D.2 DEL ANEXO II DE LA DIRECTIVA 2001/18/CE**

De acuerdo con la información contenida en evaluación del riesgo para el medio ambiente incluida en las notificaciones anteriores en España, no se esperan riesgos para la salud humana o el medio ambiente como resultado de la liberación intencional del maíz modificado genéticamente 1507x59122 resistente a ciertos insectos lepidópteros y coleópteros y tolerante al glufosinato.

### **E. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE TODAS LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL NOTIFICADOR PARA CONTROLAR EL RIESGO, INCLUIDO EL AISLAMIENTO PARA LIMITAR LA DISPERSIÓN, COMO, POR EJEMPLO, PROPUESTAS DE SEGUIMIENTO INCLUIDO EL SEGUIMIENTO DESPUÉS DE LA COSECHA**

La liberación del polen de las plantas modificadas genéticamente se controlará manteniendo una distancia de aislamiento de 200 metros con respecto a otro cultivo comercial de maíz. Además, como se hace en los ensayos de maíz convencional, el lugar del ensayo se rodeará con filas de bordura agronómica de maíz convencional de una madurez similar. Estas filas de bordura agronómica también se destruirán al final de la liberación.

Al estar insertados en el zuro y cubiertos por numerosas espigas que les protegen del exterior, los granos, por regla general, no se dispersan. Si se tuviesen que recoger algunos granos para los análisis, se recogerá toda la mazorca y se destruirán la mazorca y todos los granos que no se utilicen.

En el caso de que sea necesario, el ensayo podría detenerse y destruirse mediante la destrucción mecánica o la pulverización con un herbicida distinto del glufosinato, y mediante la incorporación en el suelo con un roturado profundo.

Al final de la liberación, todo el material vegetal que no haya sido recogido para su análisis será destruido troceándolo e incorporándolo al suelo mediante un roturado profundo. Ninguna planta ni producto del ensayo entrará en la cadena alimentaria.

Tras la liberación, la parcela se visitará durante el año siguiente para asegurar la retirada de plantas adventicias de maíz si las hubiera. Aunque las plantas adventicias en general no pueden sobrevivir a un invierno duro, las plantas adventicias de maíz, si las hubiera, serían sometidas a seguimiento para asegurar su destrucción antes de la floración.

No se sembrará maíz comercial en la misma parcela el año siguiente.

#### **F. RESUMEN DE LOS ENSAYOS DE CAMPO PREVISTOS PARA OBTENER NUEVOS DATOS SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA LIBERACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD HUMANA (SI PROCEDE)**

No es aplicable a esta liberación.