


Informe Láridos 2011. Avance a fecha 24 de mayo

Gaviota de Audouin

El censo de 24 de abril de 2011 contabiliza hasta 1.403 adultos de *Larus audouinii* en Rey, frente a 1.656 gaviotas patiamarillas. El censo se hace respecto a el mapa de distribución espacial "Sectores láridos REY".

El reparto sobre el terreno de los adultos censados representa tan solo una primera aproximación a las ubicaciones que adoptarán para la cría pues en esas fechas se congregan más en los lugares aptos para acceder hacia el mar que en los que utilizarán para sus nidos.

Sectores láridos REY



Al comparar ambas columnas de números se pueden señalar de una parte la desigual proporción entre las poblaciones de ambas especies (1,18 de *Larus michahellis* frente a 0,85 de *L. audouinii*).

Esta desproporción se traduce en diferentes abundancias relativas en cada sector explorado que, más tarde, podrían explicar un porqué de la distribución final de los núcleos de nidos.



SECTOR	L.michahellis	L.audouinii
1	65	0
2	9	0
3	50	92
4	50	55
5	49	66
6	47	29
7	25	96
8	22	15
9	60	44
10	18	74
11	11	229
12	19	142
13	16	30
14	4	0
15	0	0
16	68	11
17	72	25
18	4	16
19	33	19
20	3	2
30	94	0
31	144	169
33	19	286
36	291	3
38	163	0
39	320	0
	1.656	1.403

Sector	L.m.	L.a.	Lm/La	L.a./L.m.
1	65	0		0,00
2	9	0		0,00
3	50	92	0,54	1,84
4	50	55	0,91	1,10
5	49	66	0,74	1,35
6	47	29	1,62	0,62
7	25	96	0,26	3,84
8	22	15	1,47	0,68
9	60	44	1,36	0,73
10	18	74	0,24	4,11
11	11	229	0,05	20,82
12	19	142	0,13	7,47
13	16	30	0,53	1,88
14	4	0		0,00
15	0	0		
16	68	11	6,18	0,16
17	72	25	2,88	0,35
18	4	16	0,25	4,00
19	33	19	1,74	0,58
20	3	2	1,50	0,67
30	94	0		0,00
31	144	169	0,85	1,17
33	19	286	0,07	15,05
36	291	3	97,00	0,01
38	163	0		0,00
39	320	0		0,00
	1.656	1.403	1,18	0,85

Con este panorama, los sectores en que *Larus audouinii* predomina claramente sobre *L. michahellis* (7, 11, 12, 18 y 33) serían los seleccionados para formar núcleos de reproducción.


Hacia finales de abril se elabora una primera aproximación cartográfica a dicha distribución. El mapa provisional muestra que los núcleos parecen apuntar a instalarse en los antes denominados sectores 12 y 13, 18 y 33, 10, 9, 7, 6 y 5, 4 y 3.

Sectores láridos REY



El censo de nidos realizado el 22 de mayo de 2011 arroja unos resultados coherentes con lo anterior.

Espacialmente se aprecia la definitiva instalación en 7 núcleos lo que corresponde con una buena aproximación a lo esperado según el avance provisional de finales de abril.



Sector	L.m.	L.a.	Lm/La	L.a./L.m.	
1	65	0		0,00	
2	9	0		0,00	
3	50	92	0,54	1,84	92
4	50	55	0,91	1,10	55
5	49	66	0,74	1,35	66
6	47	29	1,62	0,62	
7	25	96	0,26	3,84	96
8	22	15	1,47	0,68	
9	60	44	1,36	0,73	
10	18	74	0,24	4,11	74
11	11	229	0,05	20,82	
12	19	142	0,13	7,47	142
13	16	30	0,53	1,88	30
14	4	0		0,00	
15	0	0			
16	68	11	6,18	0,16	
17	72	25	2,88	0,35	
18	4	16	0,25	4,00	
19	33	19	1,74	0,58	
20	3	2	1,50	0,67	
30	94	0		0,00	
31	144	169	0,85	1,17	
33	19	286	0,07	15,05	286
36	291	3	97,00	0,01	
38	163	0		0,00	
39	320	0		0,00	
Total	1.656	1.403	1,18	0,85	