

Populus tremula L.

Descripción de las áreas con presencia de la especie por Región de Procedencia

R.P.	Pres. (%)	ALT. (m)			PREC. (mm)		A (meses)	TEMP. (°C)			OSC (°C)	Hs	Tipo de suelo (FAO) (%)
		MED	MAX	MIN	ANUAL	V		MED	MAXMC	MINMF			
1	0,2	272	536	8	1525	127	0,9	13,4	26,7	3,1	12,1	0,0	RK(100)
2	0,5	536	641	471	1184	124	1,1	11,6	25,7	1,7	12,9	0,0	CMu(75) RK(25)
3	0,8	229	421	78	1328	194	0,0	13,0	23,7	3,5	10,7	0,0	CMu(72) LPc(14) LVx(14)
4	1,8	893	1650	242	1369	179	0,1	9,9	24,2	-0,9	13,8	2,3	CMu(63) CMc(25) RK(12)
5	4,9	1156	1623	795	1072	131	0,8	8,7	25,0	-3,0	15,4	4,2	CMu(53) RK(19) CMc(14)
6	2,5	382	937	52	1517	234	0,0	12,4	24,1	3,0	12,3	0,0	CMc(45) CMu(32) LVx(18)
7	2,9	786	1125	236	988	145	0,3	10,5	25,2	0,2	14,6	0,7	CMc(68) CMu(24)
8	24,7	1384	2221	644	1047	267	0,0	8,1	24,7	-4,8	16,9	5,2	CMu(53) CMc(29)
9	42,0	801	1885	218	1025	264	0,0	11,3	26,9	-1,5	16,5	2,4	CMc(74) CMu(17)
10	5,6	376	924	54	894	185	0,5	13,9	28,2	1,4	15,7	0,2	CMd(39) CMc(27) CMu(18)
11	3,7	704	1192	457	712	175	0,6	12,2	29,2	-1,0	18,3	1,9	CMc(81) CMe(19)
14	0,2	783	975	591	536	122	2,0	11,3	27,5	0,0	16,3	1,0	CMc(50) CMg(50)
15	2,1	1240	1743	691	769	145	0,6	8,9	25,8	-2,7	16,2	4,1	CMc(67) CMu(28)
16	1,1	1033	1129	839	682	105	1,8	10,1	27,5	-1,8	16,5	3,2	CMc(30) CMu(30) CMg(20) CMe(10) FLe(10)
17	0,6	936	952	909	605	75	2,6	10,6	28,3	-1,4	16,1	3,1	CMe(50) CMu(25) LVv(25)
19	1,5	1315	1579	804	743	81	2,3	10,1	28,8	-2,4	17,5	4,0	CMu(54) CMd(31)
20	2,9	1429	1896	861	925	113	1,6	9,1	26,6	-2,5	17,3	3,8	CMu(80)
21	0,1	982	982	982	572	83	2,8	12,0	31,2	-0,6	17,9	1,8	CMc(100)
22	0,6	1281	1487	1007	796	119	1,7	9,9	28,9	-2,8	17,8	4,3	CMc(100)
26	0,5	968	1016	891	606	80	2,7	12,3	31,8	-0,9	19,3	2,2	CMc(75) CMu(25)
28	0,2	467	535	398	478	51	4,1	15,1	34,5	1,2	19,8	0,0	FLe(50) LVv(50)
29	0,1	830	830	830	788	72	3,0	13,6	33,1	0,4	19,4	0,0	CMe(100)
30	0,2	411	470	351	605	39	3,9	16,1	34,7	3,5	18,5	0,0	CMe(100)
39	0,1	1632	1632	1632	499	53	3,0	10,5	28,7	-2,3	16,8	3,7	CMe(100)