

Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758)

Castellano: Agachadiza común

Catalán: Becadell comú

Gallego: Becacina craba

Vasco: Istingor arrunta

CATEGORIA DE AMENAZA

ESPAÑA: INSUFICIENTEMENTE CONOCIDA

CE: NO AMENAZADA

MUNDO: NO AMENAZADA

DISTRIBUCION

ESPAÑA: Existe un pequeño núcleo nidificante en Galicia, Asturias y Sistema Central (Avila y tal vez Salamanca). Posible cría en el País Vasco y Navarra. Como migrante e invernante es bastante común, especialmente en las costas cántabroatlánticas y en las mediterráneas (dos flujos migratorios diferentes); repartida también por el resto de la Península y por Baleares (1). En Canarias, migrante e invernante no muy común.

CE: Un mínimo núcleo en el norte de Portugal (2) y otro en el norte de Italia; en Francia y en Alemania existen localidades de cría discontinuas pero abundantes. En los demás países, bastante repartida. Migrador parcial, las poblaciones nórdicas y centro-europeas invernán ya en Europa occidental y meridional y en África.

MUNDO: Nidifica en la mitad superior de América del norte, en casi toda América del sur, en Islandia, en África oriental y meridional, en casi toda Europa y en Asia, en su mitad superior, al norte de los 50° N. Migrador parcial, con las poblaciones septentrionales invernando al sur de sus áreas de cría, especialmente en América del sur, África y grandes penínsulas asiáticas.

HABITAT

Zonas próximas al agua, en pastizales y junqueras húmedas, a veces encharcados; en ocasiones en matorral bajo. En paso e invernada, en los mismos puntos y también en orillas de ríos y charcas, marismas herbosas, juncales y cultivos (arrozales). Algunas veces en zonas costeras marinas.

POBLACION

ESPAÑA: En Galicia la población indígena es mínima, seguramente inferior al centenar de parejas (3); en Asturias (4), muy escasa como nidificante; en el Sistema Central parece nidificar ocasionalmente. La población migrante e invernante es abundante, pero no ha sido cuantificada.

CE: En Portugal (2), entre 100 y 1.000 parejas (pero la primera cifra parece mas real). En Francia, entre 300-350 parejas; en Benelux, unas 5.500 parejas, la mayoría en Holanda; en Alemania (oeste), unas 17.000 parejas; Dinamarca, unas 2.000-4.000 parejas; Italia, unas 1 000 parejas (5). En Gran Bretaña (6), unas 30.000 parejas.

MUNDO: En el resto de Europa, 55.000 parejas en Noruega; en Suecia, unas 150.000 parejas; en Finlandia, unas 90.000 parejas; en Estonia, unas 10.000 parejas (5).

AMENAZAS

Para la población nidificante, principalmente la destrucción del hábitat de cría; también las molestias crecientes por aumento de trasiego humano. Para la población en paso e invernante, la destrucción de humedales y la caza incontrolado.

MEDIDAS DE CONSERVACION

Conservación del hábitat, cada vez menos extenso. Control de la caza abusiva.

REFERENCIAS

- 1 . Asensio, B., y Carrascal, L. M.(1987); "Migratología de las Agachadizas Comunes(*Gallinago gallinago*, L.) invernantes en la Península Ibérica,.. *Ardeola*, 34: 225-242.
2. Rufino, R., ed. (1989): *Atlas das aves que nidificam em Portugal Continental*. CEMPA, Lisboa.
3. Fernández-Cordeiro, A., y Domínguez, J. (1991): ,Catálogo provisional de aves nidificantes amenazadas en Galicia,.. *Actas Primeiro Congreso Galego Omitoloxía*. (Fernández-Cordeiro, A., y Domínguez, J., eds.): 269-271. Univ. de Santiago. Santiago de Compostela.
4. Noval, A. (1 986): *Guía de las Aves de Asturias*. Noval, Gijón.
5. Cramp, S., y Simmons, K. E. L. (1982): *The Birds of the Westem Palearctic. Vol III*. Oxford University Press, Oxford
6. Piersma, T., ed. (1986): "Breeding Wadersin Europe,". *Wader Study GroupBull.*, 8, Supl.: 1-116.