

# Cuculus canorus

# (Cuco común)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA




© FERNANDO ROMÃO

**Cuculus canorus (Cuco común).** Su distribución abarca la mayor parte de Europa, así como la práctica totalidad del territorio de la Península Ibérica. El Cuco común está presente en todo tipo de hábitats forestales, siempre que existan las poblaciones de aves adecuadas para el parasitismo de reproducción y las larvas de invertebrados que constituyen su alimentación. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14,8°C y 36,7°C, y el de precipitaciones entre 228 mm y 1949 mm anuales.

## SITUACIÓN ACTUAL

## SITUACIÓN FUTURA

ECHAM4  
CGCM2  
CGCM2 Y ECHAM4



PRESENCIA  
ÁREA POTENCIAL

### Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos moderados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 65% y un 69% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 25% y un 28% en 2041-2070.


TSS: 0,5187

## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	427200 (85%)	% Protegido actualmente:	(58%)
Área potencial:	360400	% Protegido futuro:	(19%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
2011-2040	297800 (-17%)	300500 (-17%)	(65%)	(66%)
2041-2070	211000 (-41%)	252600 (-30%)	(48%)	(57%)
2071-2100	144500 (-60%)	216300 (-40%)	(33%)	(49%)
<b>ECHAM4</b>				
2011-2040	158300 (-56%)	158300 (-56%)	(36%)	(36%)
2041-2070	111500 (-69%)	124900 (-65%)	(25%)	(28%)
2071-2100	84300 (-77%)	106100 (-71%)	(19%)	(24%)



### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.
- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.