

MINERALIZACIÓN DEL NITRÓGENO DEBIDA A LA PÉRDIDA DE MATERIA ORGÁNICA DEL SUELO POR CAMBIOS EN EL USO DE LA TIERRA EN SUELOS MINERALES


ACTIVIDADES CUBIERTAS SEGÚN NOMENCLATURA	
NOMENCLATURA	CÓDIGO
SNAP 97	-
CRF	4(III)
NFR	-

Descripción de los procesos generadores de emisiones

De acuerdo con la Guía IPCC 2006 (apartado 11.2.1, capítulo 11, volumen 4), en la mayoría de los suelos, un incremento del nitrógeno (N) disponible aumenta las tasas de nitrificación y desnitrificación que, a su vez, incrementan la producción de N₂O, que se libera a la atmósfera.

El aumento del N disponible en el suelo puede producirse, según la Guía IPCC 2006, por aportes de N directos del hombre o por cambios en el uso de la tierra¹ y/o en las prácticas de gestión que mineralicen el N orgánico del suelo

En esta ficha se recoge la metodología aplicada para la estimación de las emisiones directas de N₂O de los suelos minerales asociadas a la mineralización de N relacionada con la pérdida de carbono orgánico del suelo (*soil organic carbon*, SOC, en inglés), como resultado de cambios en el uso de la tierra².



Fuente: Elaboración propia.

Los cambios en las prácticas de gestión en los usos de la tierra que permanecen como tales también pueden generar pérdidas en las existencias de SOC que provoquen la mineralización del N contenido en la materia orgánica del suelo y, finalmente, una emisión de N₂O. Sin embargo, dada la carencia de información acerca de las prácticas de gestión en estos usos, diferentes de las tierras de cultivo, en el Inventario Nacional no se han estimado las emisiones directas de N₂O debido a éstas prácticas.

Contaminantes inventariados

Gases de efecto invernadero

CO ₂	CH ₄	N ₂ O	HFCs	PFCs	SF ₆
NA	NA	✓	NA	NA	NA

OBSERVACIONES:

- *Notation keys* correspondientes al último reporte a UNFCCC.

¹ Para más información puede consultarse la Ficha introductoria al sector Usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y silvicultura.

² La metodología aplicada en la estimación de las emisiones indirectas de N₂O puede consultarse en la ficha metodológica "Lixiviación y escorrentía del N mineralizado debido a la pérdida de materia orgánica del suelo por cambios en el uso de la tierra en suelos minerales".

Contaminantes atmosféricos

Contaminantes principales				Material particulado				Otros	Metales pesados prioritarios			Metales pesados adicionales					Contaminantes orgánicos persistentes					
NOx	NMVOG	SO ₂	NH ₃	PM _{2.5}	PM ₁₀	TSP	BC	CO	Pb	Cd	Hg	As	Cr	Cu	Ni	Se	Zn	DIOX	PAH	HCB	PCB	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

OBSERVACIONES:

- Notation keys correspondientes al último reporte a CLRTAP.

Sectores del Inventario vinculados

Las actividades del Inventario relacionadas con la presente ficha metodológica son las siguientes:

RELACIÓN CON OTRAS FICHAS METODOLÓGICAS			
ACTIVIDAD SNAP	ACTIVIDAD CRF	ACTIVIDAD NFR	DESCRIPCIÓN
-	4	-	Ficha introductoria al sector Usos de la tierra, cambios de uso de la tierra y selvicultura
-	4A2 LB	-	Cambio en las existencias de C de la biomasa viva en tierras forestales en transición
-	4B2/4C2 /4D2/4E2/4F2 LB	-	Cambio en las existencias de C de la biomasa viva en tierras en transición
-	4A2/4B2/4C2 /4D2/4E2 DW	-	Cambio en las existencias de C de la madera muerta en tierras en transición
-	4A2/4B2/4C2 /4D2/4E2/4F2 LT	-	Cambio en las existencias de C del detritus en tierras en transición
-	4A2/4B2/4C2 /4D2/4E2/4F2 SOC	-	Cambio en las existencias de C orgánico del suelo en suelos minerales en las tierras en transición
-	4(IV)	-	Lixiviación y escorrentía del N mineralizado debido a la pérdida de materia orgánica del suelo por cambios en el uso de la tierra en suelos minerales
-	4(V)	-	Incendios y quemadas controladas

En el sector Agricultura, subsector Cultivos, se describe la metodología aplicada para la estimación de las emisiones directas de N₂O asociadas a la fertilización del suelo en las fichas metodológicas: “Fertilización inorgánica”, “Fertilización con estiércol”, “Fertilización con lodos”, “Fertilización con compost” y “Fertilización con restos vegetales”.

Descripción metodológica general

Contaminante	Tier	Fuente	Descripción
N ₂ O	T1	IPCC 2006. Volumen 4. Capítulo 11. Apartado 2.1.	<p>La metodología aplicada para la estimación de estas emisiones directas de N₂O se basa en la ecuación 11.1 de la Guía IPCC 2006, de la que sólo se estima en este epígrafe la parte relativa a la pérdida de C del suelo de la materia orgánica del suelo como resultado de los cambios en el uso ($F_{SOM} \times EF_1$).</p> <p>Para estimar la cantidad de nitrógeno mineralizado por estas causas (F_{SOM}), se utiliza la ecuación 11.8 de la Guía IPCC 2006⁽¹⁾, que depende de la cantidad de SOC perdida en suelos minerales por cambios de uso de la tierra.</p> <p>La metodología de estimación de los cambios en las existencias de C de los suelos minerales en las transiciones ya ha sido descrita en la ficha metodológica “Cambio en las existencias de carbono orgánico del suelo en suelos minerales en tierras en transición”, habiéndose producido pérdidas de SOC en las transiciones a FL, CL, GL, SL y OL.</p> <p>La conversión de emisiones de N₂O–N en emisiones de N₂O a los efectos de la declaración se realiza multiplicándolas por 44/28.</p>

OBSERVACIONES:

⁽¹⁾ En la citada ecuación 11.8, el factor *R*, relación C:N de la materia orgánica del suelo, puede adoptar un valor por defecto de 15 para situaciones que impliquen cambios en el uso de la tierra de tierras forestales o pastizales a tierras de cultivo (página 11.17, capítulo 11, volumen 4). Este valor ha sido adoptado para todas las transiciones, en ausencia de datos propios del país.

Variable de actividad

Variable	Descripción
Pérdida de existencias de SOC en suelos minerales	La variable de actividad de esta emisión es el cambio de existencias de SOC en suelos minerales que se produce en las transiciones entre usos de la tierra, concretamente las pérdidas, expresadas en kt C.

Fuentes de información sobre la variable de actividad

Pérdidas de existencias de SOC en suelos minerales en las transiciones entre usos de la tierra	
Periodo	Fuente
1990-2017	Ficha metodológica "Cambio en las existencias de carbono orgánico del suelo en suelos minerales en tierras en transición".

Fuente de los factores de emisión

Contaminante	Periodo	Tipo	Fuente	Descripción
N ₂ O	1990-2017	D	IPCC 2006. Volumen 4. Capítulo 11. Apartado 2.1.	Factor de emisión (EF_1) por defecto de la tabla 11.1 de la Guía IPCC 2006.

OBSERVACIONES: D: por defecto (del inglés "Default"); CS: específico del país (del inglés "Country Specific"); OTH: otros (del inglés "Other"); M: modelo (del inglés "Model").

Incertidumbres

La incertidumbre de esta actividad se calcula a nivel de CRF (4(III)) y se recoge en la siguiente tabla:

Contaminante	Inc. VA (%)	Inc. FE (%)	Descripción
N ₂ O	300	200	<p>Variable de actividad: La incertidumbre asignada de forma cualitativa al cambio en las existencias de C de SOC de los suelos minerales, correspondiente con el valor máximo tabulado de la escala de gradación, correspondiente a la clase D (300 %)⁽¹⁾.</p> <p>Factor de emisión: La incertidumbre asignada al factor de emisión, de acuerdo con la información de la Guía IPCC 2006 (tabla 11.1, capítulo 11, volumen 4).</p>

OBSERVACIONES:
⁽¹⁾ La incertidumbre de los factores de emisión/absorción en el sector LULUCF se asigna, por lo general, de forma cualitativa, siguiendo la escala de clasificación establecida en la tabla 3.2 "Rating definitions" del capítulo 5 "Uncertainties" de la parte A "General Guidance Chapters" de la Guía EMEP/EEA 2013, que varía entre la letra A (10 a 30 %) y la letra E (mayor incertidumbre, sin valor asignado).

Coherencia temporal de la series

La serie temporal se considera temporalmente homogénea dado que se utilizan los mismos valores de SOC por uso y provincia (o nacional) para todo el periodo inventariado (1990-2017), utilizando, además, la misma metodología de estimación de emisiones.

Observaciones

No procede.

Criterio para la distribución espacial de las emisiones

Los valores de SOC adoptados son provinciales (o, en algunos casos, nacionales) y propios de cada uso de la tierra.

Juicio de experto asociado

No procede.

Fecha de actualización

Mayo 2019.

ANEXO I

Datos de la variable de actividad

Pérdida de existencias de C del suelo en las transiciones entre usos de la tierra (cifras en kt C)

Año	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017
L → FL	9,65	31,28	46,01	70,15	69,42	54,91	51,93	49,22
GL → FL	9,45	30,79	44,80	67,14	66,59	52,36	49,41	46,90
WL → FL	0,20	0,48	1,22	3,00	2,83	2,55	2,52	2,32
L → CL	97,25	313,23	529,22	556,29	484,63	291,17	252,47	213,78
FL → CL	55,84	64,80	73,75	79,56	28,05	20,34	18,80	17,26
GL → CL	41,41	248,44	455,47	476,73	456,59	270,82	233,67	196,51
L → GL	0,23	1,36	2,50	3,77	4,81	4,94	4,97	4,99
FL → GL	0,23	1,36	2,50	3,77	4,81	4,94	4,97	4,99
L → WL	-	-	-	-	-	-	-	-
L → SL	77,89	89,47	100,98	124,67	157,06	173,04	176,23	179,43
FL → SL	25,80	22,83	19,59	14,79	14,14	12,88	12,63	12,38
CL → SL	27,17	36,77	46,46	66,43	88,31	100,43	102,85	105,28
GL → SL	24,93	29,87	34,93	43,45	54,61	59,72	60,75	61,77
L → OL	81,05	95,62	110,46	66,72	29,66	14,83	11,87	8,90
GL → OL	81,05	95,62	110,46	66,72	29,66	14,83	11,87	8,90
Total	266,06	530,97	789,16	821,59	745,59	538,88	497,47	456,32

Nota: El guion (-) se utiliza cuando no hay pérdidas de C.

ANEXO II

Datos de factores de emisión

El factor de emisión para emisiones de N₂O de aportes de N (EF_1) adopta un valor por defecto de 0,01 kg N₂O–N/(kg N), según la tabla 11.1 de la Guía IPCC 2006.

Ficha Técnica

ANEXO III

Cálculo de emisiones

Las fórmulas de cálculo de las emisiones son las siguientes:

$$N_2O - N = F_{SOM} \times EF_1$$
$$F_{SOM} = \sum_{LU} \left[\left(\Delta C_{Minerales,LU} \times \frac{1}{R} \right) \times 1000 \right]$$

donde,

$N_2O - N$: emisiones directas anuales de N_2O-N , en $kg N_2O-N/año$.

F_{SOM} : cantidad anual de N en suelos minerales que se mineraliza, relacionada con la pérdida de C del suelo de la materia orgánica del suelo como resultado de cambios en el uso de la tierra, en $kg N/año$.

EF_1 : factor de emisión para emisiones de N_2O de aportes de N, en $kg N_2O-N/(kg \text{ aporte de N})$.

$\Delta C_{Minerales,LU}$: pérdida promedio anual de C del suelo para cada tipo de uso de la tierra (LU), en t C.

R: relación C:N de la materia orgánica del suelo.

La metodología de estimación de los cambios en las existencias de C del suelo en las transiciones ya ha sido descrita en la ficha metodológica "Cambio en las existencias de carbono orgánico del suelo en suelos minerales en tierras en transición".

De acuerdo con la Guía IPCC 2006, la conversión de emisiones de N_2O-N en emisiones de N_2O a los efectos de la declaración se realiza multiplicándolas por 44/28.

A continuación se presenta un ejemplo para la transición de Pastizales a Tierras de cultivo (GL → CL), en el año 1990, con una pérdida anual de C en el suelo de 41,41 kt C:

$$Emisiones \ de \ N_2O \ (t) = \left[\left[\left(41,41 \times \frac{1}{15} \right) \times 1000 \right] \times 0,01 \right] \times \left(\frac{44}{28} \right) = 43,38 \ t \ N_2O$$

ANEXO IV

Emisiones

Emisiones directas de N₂O procedentes de la mineralización del N debida a la pérdida de materia orgánica del suelo por cambios en el uso de la tierra en suelos minerales (cifras en toneladas de N₂O)

Año	1990	1995	2000	2005	2010	2015	2016	2017
L → FL	10,11	32,77	48,21	73,49	72,73	57,52	54,40	51,56
GL → FL	9,90	32,26	46,93	70,34	69,77	54,85	51,77	49,14
WL → FL	0,21	0,51	1,28	3,15	2,96	2,67	2,64	2,43
L → CL	101,88	328,15	554,42	582,78	507,71	305,03	264,50	223,96
FL → CL	58,50	67,88	77,26	83,35	29,38	21,31	19,70	18,09
GL → CL	43,38	260,27	477,15	499,43	478,33	283,72	244,80	205,87
L → GL	0,24	1,43	2,62	3,95	5,04	5,18	5,20	5,23
FL → GL	0,24	1,43	2,62	3,95	5,04	5,18	5,20	5,23
L → WL	-	-	-	-	-	-	-	-
L → SL	81,60	93,73	105,79	130,60	164,54	181,28	184,63	187,97
FL → SL	27,03	23,92	20,52	15,50	14,81	13,50	13,23	12,97
CL → SL	28,46	38,52	48,67	69,59	92,51	105,21	107,75	110,29
GL → SL	26,11	31,30	36,59	45,52	57,21	62,57	63,64	64,71
L → OL	84,91	100,18	115,72	69,90	31,08	15,54	12,43	9,32
GL → OL	84,91	100,18	115,72	69,90	31,08	15,54	12,43	9,32
Total	278,73	556,25	826,74	860,71	781,09	564,54	521,16	478,05

Nota: El guion (-) se utiliza cuando no hay pérdidas de C.