

Albariño



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación nula o muy débil
Densidad muy densa

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Color nudo Rojo en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Media en nudos

Hoja joven:

Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales Nula o muy débil-débil

Densidad pelos tumbados Media entre nervios
Media sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Medio

Forma del limbo Deltoide

Número de lóbulos Tres

Disposición lóbulos del seno peciolar Muy abierto en V

Hinchazón del haz Media

Perfil en sección transversal Plano

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad muy superficial con lóbulos abiertos



Pigmentación del haz Débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Media

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Nula o muy débil

Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo Pecíolo entre ligeramente más corto que el nervio central e igual al nervio central con densidad entre baja y media de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes rectilíneos de longitud cortos y con relación longitud-anchura mediana



Albariño



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Pequeño
<i>Compacidad</i>	Medio-compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa-mediana
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Gusto especial
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: precoz

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Vigor medio, porte entre semierguido y horizontal.
- Fertilidad bastante elevada.
- Requiere terrenos frescos. Poda en varas largas. Conducción apoyada en emparrado o en cordón.
- Poco sensible a botrytis, resiste bastante al mildiu y muy sensible al oídio.

Potencial enológico:

- Variedad de gran calidad, se elaboran vinos monovarietales y complementarios.
- Vinos con graduación alcohólica elevada y con acidez notable.
- Gran potencial aromático afrutado con matices a veces florales.
- Calidad global enológica: excelente.

