

Cabernet Franc



Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta

Pelos postrados de la extremidad Pigmentación media
Densidad media

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Color nudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde en la cara ventral

Densidad pelos tumbados Nula o muy baja en nudos
Nula o muy baja en entrenudos

Hoja joven:

Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales Débil

Densidad pelos tumbados Baja entre nervios
Baja sobre nervios

Hoja adulta:

Tamaño del limbo Pequeño

Forma del limbo Pentagonal

Número de lóbulos Cinco

Disposición lóbulos del seno peciolar Poco abierto-ligeramente superpuestos

Hinchazón del haz Débil

Perfil en sección transversal Forma de V

Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores Profundidad media con lóbulos abiertos

Pigmentación del haz Ausente o muy débil

Densidad pelos tumbados entre nervios principales Baja

Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales Nula o muy baja

Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo Peciolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja-baja de pelos tumbados

Forma y longitud de dientes Dientes con ambos lados convexos, de longitud cortos-medios y con relación longitud-anchura mediana



Cabernet Franc



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Medio
<i>Compacidad</i>	Medio
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Pequeña
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Negra-azul
<i>Forma del perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Media-gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Herbáceo
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Lisa

Fenología:

Época de desborre: temprana

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Variedad bastante vigorosa.
- Mejores resultados en suelos arcillosos y calcáreos, o en suelos arenosos si no hay estrés hídrico.
- Medianamente resistente a la botrytis. Relativamente sensible a yesca y eutipia. Bastante sensible a los cicadélicos.

Potencial enológico:

- Vinos aromáticos (frambuesa, violeta).
- Niveles de azúcar, acidez y polifenoles menores que los de Cabernet Sauvignon. Dan vinos jóvenes más ligeros y más agradables. Envejecen bien.

