

Garnacha Peluda



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil-media Densidad alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
------------------------	---

<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
-------------------	---

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en el nudo Baja en el entrenudo
--------------------------------	--

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Media
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Fuerte-muy fuerte

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Media
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Abierto en V
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Nula
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy débil
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Baja
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud media y con relación longitud-anchura mediana



Garnacha Peluda



Racimo:

Tamaño	Mediano
Compacidad	Compacto-muy compacto
Longitud pedúnculo	Muy corto

Baya:

Tamaño	Mediana
Uniformidad tamaño	Uniforme
Color Epidermis	Rojo-violeta oscuro
Forma de perfil	Esférica
Separación pedicelo	Difícil
Grosor piel	Fina
Pigmentación pulpa	No coloreada
Consistencia pulpa	Blanda
Suculencia pulpa	Jugosa
Sabores particulares	Ninguno
Formación pepitas	Presentes

Sarmiento:

Color	Marrón
Relieve superficie	Estriado

Fenología:

Época de desborre: media-tardía

Época de maduración: tardía

Aptitudes agronómicas:

- Planta muy vigorosa, porte erguido.
- Fertilidad elevada. Producciones medias, racimos medianos.
- Muy resistente a sequía, pero menos que la Garnacha Tinta, se adapta a todo tipo de suelos. Se puede podar en poda corta o larga.
- Sensible a mildiu y algo sensible a botrytis, es menos sensible al corrimiento de racimo que Garnacha Tinta.

Potencial enológico:

- Vinos alcohólicos, color granate con intensidad colorante media, aromas ligeros con tonos de fruta madura, acidez media, paso de boca ligero.
- Se emplea en la mezcla con Tempranillo y Cabernet para elaborar vinos de crianza. Como vino joven su vida es corta por su rápida oxidación.

