

# Gewürztraminer



## Ampelografía

### Sumidad:

*Apertura extremidad* Completamente abierta

*Pelos postrados de la extremidad* Pigmentación media  
Densidad alta

### Pámpano:

*Color entrenudo* Verde con rayas rojas en la cara dorsal  
Verde en la cara ventral

*Color nudo* Verde en la cara dorsal  
Verde-verde con rayas rojas en la cara ventral

*Densidad pelos tumbados* Nula o muy baja en nudos  
Nula o muy baja en entrenudos

### Hoja joven:

*Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales* Nula o muy débil-débil

*Densidad pelos tumbados* Muy densa entre nervios  
Baja-media sobre nervios

### Hoja adulta:

*Tamaño del limbo* Pequeño

*Forma del limbo* Orbicular

*Número de lóbulos* Cinco

*Disposición lóbulos del seno peciolar* Cerrados

*Hinchazón del haz* Media

*Perfil en sección transversal* Plano en forma de V

*Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores* Profundidad media con lóbulos entre abiertos y cerrados

*Pigmentación del haz* Media-fuerte

*Densidad pelos tumbados entre nervios principales* Baja-media

*Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales* Baja

*Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo* Peciolo ligeramente más corto que el nervio principal con densidad baja de pelos tumbados

*Forma y longitud de dientes* Dientes con ambos lados convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura pequeña



# Gewürztraminer



## **Racimo:**

<i>Tamaño</i>	Muy pequeño
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Medio

## **Baya:**

<i>Tamaño</i>	Pequeña
<i>Uniformidad tamaño</i>	No uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Rosa
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Especial
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

## **Sarmiento:**

<i>Color</i>	Marrón amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

## **Fenología:**

**Época de desborre:** temprana

**Época de maduración:** muy temprana

## **Aptitudes agronómicas:**

- Vigoroso. Prefiere suelos profundos y arcillosos, y portainjertos débiles o medianamente vigorosos. Se cultiva en espaldera con poda larga.
- Sensible al corrimiento, bastante sensible a heladas primaverales y muy sensible al desecamiento del raspón.
- Sensible al mildiu, poco sensible a oídio y muy sensible a botrytis.

## **Potencial enológico:**

- Buen potencial de acumulación de azúcares. En terrenos favorables da vinos de gran calidad medianamente ácidos, con cuerpo y con aromas potentes y particulares (rosa, lichi).
- Dichos aromas en climas cálidos se vuelven más fuertes y menos elegantes.