

# Loureira

Sinonimias: Loureiro Blanco. Marqués



## Ampelografía

### Sumidad:

*Apertura extremidad* Completamente abierto

*Pelos postrados de la extremidad* Pigmentación débil-media  
Densidad alta

### Pámpano:

*Color entrenudo* Rojo en la cara dorsal  
Verde con rayas rojas en la cara ventral

*Color nudo* Rojo en la cara dorsal  
Verde con rayas rojas en la cara ventral

*Densidad pelos tumbados* Nula-baja en el nudo  
Nula-baja en el entrenudo

### Hoja joven:

*Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales* Nula o muy débil-débil

*Densidad pelos tumbados* Densa entre nervios  
Media sobre nervios

### Hoja adulta:

*Tamaño del limbo* Medio

*Forma del limbo* Pentagonal

*Número de lóbulos* Cinco

*Disposición lóbulos del seno peciolar* Medio abierto-poco abierto

*Hinchazón del haz* Media

*Perfil en sección transversal* Con bordes hacia el envés

*Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores* Profundidad superficial con lóbulos abiertos


*Pigmentación del haz* Baja-media

*Densidad pelos tumbados entre nervios principales* Densa

*Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales* Media

*Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo* Peciolo más largo que el nervio central con densidad baja de pelos tumbados

*Forma y longitud de dientes* Dientes con lados recilíneos de longitud media y con relación longitud-anchura pequeña-mediana



# Loureira



## **Racimo:**

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| <i>Tamaño</i>             | Medio          |
| <i>Compacidad</i>         | Medio-compacto |
| <i>Longitud pedúnculo</i> | Muy corto      |

## **Baya:**

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| <i>Tamaño</i>               | Pequeña             |
| <i>Uniformidad tamaño</i>   | Uniforme            |
| <i>Color Epidermis</i>      | Verde-amarilla      |
| <i>Forma de perfil</i>      | Circular            |
| <i>Separación pedicelo</i>  | Difícil             |
| <i>Grosor piel</i>          | Gruesa              |
| <i>Pigmentación pulpa</i>   | Ausente o muy débil |
| <i>Consistencia pulpa</i>   | Blanda              |
| <i>Suculencia pulpa</i>     | Muy jugosa          |
| <i>Sabores particulares</i> | Gusto especial      |
| <i>Formación pepitas</i>    | Bien formada        |

## **Sarmiento:**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| <i>Color</i>              | Marrón amarillento |
| <i>Relieve superficie</i> | Lisa               |

## **Fenología:**

Época de desborre: precoz-media

Época de maduración: media-tardía

## **Aptitudes agronómicas:**

- Medio a fuerte vigor, porte semierguido, fertilidad media.
- Producción alta. Poda media.
- Terreno medio a algo seco.
- Sensibilidad media al mildiu, sensible al oídio y muy sensible a botrytis.

## **Potencial enológico:**

- Exclusivamente para vinificación.
- Vinos complementarios, poco alcohólicos. Acidez total media-elevada.
- Calidad global enológica buena.

