

# Macabeo

Sinonimias: Viura.



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil Densidad alta-muy alta

### Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
------------------------	---

<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
-------------------	---

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media en nudos Media en entrenudos
--------------------------------	---------------------------------------

### Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
---	------------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Muy densa entre nervios Densa sobre nervios
--------------------------------	--

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Medio-grande
-------------------------	--------------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Poco abierto en lira
--	----------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Bordes hacia el envés
--------------------------------------	-----------------------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos muy superpuestos
---	--


<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
-----------------------------	---------------------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Media
--	-------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
---	-----------------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo más corto que el nervio central con densidad media de pelos tumbados
--	--

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios y con relación longitud-anchura mediana
------------------------------------	---



# Macabeo



## **Racimo:**

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Compacto
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

## **Baya:**

<i>Tamaño</i>	Media
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formadas

## **Sarmiento:**

<i>Color</i>	Marrón amarillento- Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

## **Fenología:**

Época de desborre: tardía  
Época de maduración: tardía

## **Aptitudes agronómicas:**

- Variedad productiva, de porte erquido, cuyos sarmientos se desprenden fácilmente bajo la acción del viento. Fertilidad entre buena y media.
- Evitar implantarla en terrenos frescos y húmedos, así como en terrenos muy secos donde se muestra sometido al folletaje o a una caída precoz de hojas.
- Bastante sensible a ácaros, oídio. Muy sensible a podredumbre gris y necrosis bacteriana. Poco sensible al mildiu.

## **Potencial enológico:**

- Vinos de diferentes tipos. Fermentada controlando la temperatura de vinos blancos, ligeros con aromas casi florales relativamente intensos. Sabor ligeramente astringente, con un correcto equilibrio entre acidez y alcohol.
- Utilizada en el cupaje de Airen, con tintos jóvenes o de crianza para aportar acidez al conjunto.
- Aptos para fermentación en barrica. Utilizada en la elaboración de cavas.

