

# Merlot



## Ampelografía

### Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Completamente abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil-media Densidad media

### Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos

### Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
---	------------------

<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media entre nervios Baja sobre nervios
--------------------------------	---

### Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
-------------------------	--------

<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
------------------------	------------

<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
--------------------------	-------

<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio abierto en U
--	-----------------------

<i>Hinchazón del haz</i>	Media
--------------------------	-------

<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
--------------------------------------	----------

<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media con lóbulos ligeramente superpuestos
---	--

<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
-----------------------------	---------------------

<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula-baja
--	-----------

<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Baja
---	------

<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
--	--

<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud media y con relación longitud-anchura mediana
------------------------------------	--



# Merlot



## **Racimo:**

<i>Tamaño</i>	Medio
<i>Compacidad</i>	Media
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

## **Baya:**

<i>Tamaño</i>	Pequeña
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Azul-negra
<i>Forma de perfil</i>	Elíptica-ancha
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Gruesa
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda-ligeramente dura
<i>Suculencia pulpa</i>	Ligeramente jugosa-muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

## **Sarmiento:**

<i>Color</i>	Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Lisa

## **Fenología:**

Época de desborre: temprana

Época de maduración: temprana-mediana

## **Aptitudes agronómicas:**

- Vigor medio-alto con fuerte tendencia a emitir chupones. Porte semierguido que obliga a colocar un empalzamamiento que la soporte.
- Fertilidad buena. Preferible poda corta. Prefiere suelos argílicos calcáreos. Sensible al corrimiento según la climatología.
- Sensible a heladas primaverales. Poco adaptada a la sequía.
- Sensible al mildiu, cicadélidos, poco sensible a botrytis. No sensible a oídio, flavescencia dorada, ni a las enfermedades de la madera.

## **Potencial enológico:**

- Vinos redondos con cuerpo, ricos en alcohol y color. Relativamente poco ácidos.
- Vinos con taninos, pero bastante suaves que no necesitan de un alargado envejecimiento en barrica. Aromas complejos y elegantes.

