

Moscatel de Hamburgo



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Muy abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación débil Densidad débil-alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Nula o muy baja en nudos Nula o muy baja en entrenudos

Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil-débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media entre nervios Baja sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Poco abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Débil
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media con lóbulos muy superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Nula o muy baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Pecíolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud largos y con relación longitud-anchura mediana-grande



Moscatel de Hamburgo



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Media
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Rojo-violeta oscuro
<i>Forma de perfil</i>	Elíptica ancha
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil relativamente fácil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Moscatel
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón amarillento
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: media

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Vigor medio a fuerte.
- Sensible a millerandage, poco sensible a la podredumbre y al rajado de la baya.
- Uva de mesa con espesor de la piel medio, coloración poco uniforme.
- Aptitud al transporte mediocre.