

Semillón



Hoja joven:

<i>Intensidad antociánica de las 6 hojas terminales</i>	Débil-alta
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Media entre nervios Baja sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Pequeño-medio
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Medio-poco abierto
<i>Hinchazón del haz</i>	Media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Bordes hacia el envés
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad media con lóbulos ligeramente superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Baja
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el peciolo</i>	Peciolo igual al nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud medios con relación longitud-anchura pequeña

Ampelografía

Sumidad:

Apertura extremidad Completamente abierta


Pelos postrados de la extremidad Pigmentación media-fuerte
Densidad media-alta

Pámpano:

Color entrenudo Verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Color nudo Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal
Verde con rayas rojas en la cara ventral

Densidad pelos tumbados nula-baja en el nudo
nula-baja en el entrenudo



Semillón



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Medio
<i>Compacidad</i>	Medio
<i>Longitud pedúnculo</i>	Corto

Baya:

<i>Tamaño</i>	Media
<i>Uniformidad tamaño</i>	No uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde-amarilla
<i>Forma de perfil</i>	Elíptica-circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Media
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Muy jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón oscuro
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: temprana

Época de maduración: media

Aptitudes agronómicas:

- Vigor medio y bastante productivo.
- Rendimientos muy variables dependiendo de la fertilidad del medio, bien adaptada a suelos de grava o argílico-calcareos.

Potencial enológico:

- En condiciones favorables de cultivo, viñas adultas y rendimientos controlados dan vinos secos de gran calidad, muy carnosos y de una acidez débil.
- Aptos para el envejecimiento, permite también elaborar grandes vinos licorosos.
- Sobre suelos silíceos se favorece la finura, sobre calcáreos los aromas fuertes, sobre arcillosos la carnosidad.