

Ugni Blanc



Ampelografía

Sumidad:

<i>Apertura extremidad</i>	Abierta
<i>Pelos postrados de la extremidad</i>	Pigmentación nula o muy débil-débil Densidad alta-muy alta

Pámpano:

<i>Color entrenudo</i>	Verde con rayas rojas en la cara dorsal verde en la cara ventral
<i>Color nudo</i>	Verde-verde con rayas rojas en la cara dorsal Verde en la cara ventral
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Baja en nudos

Hoja joven:

<i>Intensidad antocianica de las 6 hojas terminales</i>	Nula o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados</i>	Densa entre nervios Baja sobre nervios

Hoja adulta:

<i>Tamaño del limbo</i>	Grande
<i>Forma del limbo</i>	Pentagonal
<i>Número de lóbulos</i>	Cinco
<i>Disposición lóbulos del seno peciolar</i>	Poco abierto-cerrado
<i>Hinchazón del haz</i>	Media
<i>Perfil en sección transversal</i>	Alabeado
<i>Profundidad y disposición de los lóbulos de los senos laterales superiores</i>	Profundidad superficial con lóbulos cerrados-ligeramente superpuestos
<i>Pigmentación del haz</i>	Ausente o muy débil
<i>Densidad pelos tumbados entre nervios principales</i>	Baja-media
<i>Densidad de pelos erguidos sobre nervios principales</i>	Baja
<i>Longitud y densidad de pelos sobre el pecíolo</i>	Pecíolo ligeramente más corto que el nervio central con densidad nula o muy baja de pelos tumbados
<i>Forma y longitud de dientes</i>	Dientes rectilíneos-convexos de longitud media y con relación longitud -anchura mediana



Ugni Blanc



Racimo:

<i>Tamaño</i>	Grande
<i>Compacidad</i>	Medio
<i>Longitud pedúnculo</i>	Medio

Baya:

<i>Tamaño</i>	Medio
<i>Uniformidad tamaño</i>	Uniforme
<i>Color Epidermis</i>	Verde amarillo
<i>Forma de perfil</i>	Circular
<i>Separación pedicelo</i>	Difícil
<i>Grosor piel</i>	Medio
<i>Pigmentación pulpa</i>	Ausente o muy débil
<i>Consistencia pulpa</i>	Blanda
<i>Suculencia pulpa</i>	Jugosa
<i>Sabores particulares</i>	Ninguno
<i>Formación pepitas</i>	Bien formada

Sarmiento:

<i>Color</i>	Marrón
<i>Relieve superficie</i>	Estriada

Fenología:

Época de desborre: media-tardía

Época de maduración: tardía

Aptitudes agronómicas:

- Variedad vigorosa, muy productiva.
- Sensible a heladas de invierno, mildiu y eutipiosis.
- Resistente al oídio y a la podredumbre gris.

Potencial enológico:

- Variedad propia de los viñedos de Burdeos, siendo utilizado para la elaboración del "Armagnac y "Cognac".
- Vinos de color amarillo pálido, secos, finos y con nervio.
- Resulta interesante para la mezcla con otros mostos debido a su acidez.
- Aroma aplanado.

