

***Bonasa bonasia*** (Linnaeus, 1758)

Castellano: Grévol

Catalán: Grévol

Vasco: Larreoiloa

## **CATEGORIA DE AMENAZA**

ESPAÑA: EXTINGUIDA ?

CE: VULNERABLE

MUNDO: NO AMENAZADA

## **DISTRIBUCION**

ESPAÑA: Las únicas noticias sobre su presencia corresponden a una observación realizada en 1972 en el bosque de Irati (Navarra). Parece ser un dato dudoso y probablemente nunca existió como nidificante (1).

CE: Restringido a los Alpes y regiones próximas (2). En Francia se distribuye de forma continua desde las Ardenas hasta los Alpes, pero falta en los Pirineos (3). En Bélgica, en las Ardenas (4). En Italia se encuentra en los Alpes orientales, desde el valle de Ossola hasta Alpi Giulie (4). También en Alemania y Grecia.

MUNDO: Amplia distribución en latitudes medias y altas del Paleártico. Se diferencian tres subespecies, que en conjunto ocupan desde el norte de Europa, los Urales, Polonia y Bielorrusia hasta Siberia y Japón (2).

## **HABITAT**

Se encuentra en bosques extensos y poco alterados de zonas bajas de montaña, generalmente de la taiga, pero también en formaciones caducifolias. Prefiere las zonas con arbolado alto (abetos, piceas, etc.) y con abundante sotobosque, preferentemente en las cercanías de ríos y arroyos (2).

## **POBLACION**

CE: Acusada disminución en muchas zonas de centro y oeste de la Comunidad. En Francia existen unas 1.000 a 10.000 parejas, habiéndose extinguido en los Pirineos. En Luxemburgo existen unas 20 parejas. En Alemania su número ha disminuido (2). En Italia se estiman unas 5.000-6.000 parejas, con densidades que oscilan entre 1 y 3 parejas/100 Ha. Disminución muy acusada de la población en algunas zonas a mediados de siglo (4).

MUNDO: Las mayores poblaciones europeas se encuentran en Escandinavia, Suecia (150.000 parejas), Finlandia (más de 200.000 parejas). En el sur de Polonia se estiman unos 16.000 individuos.. Otro importante núcleo se encuentra en Estonia, donde se calculan 30.000 individuos (2).

## **AMENAZAS**

En su área de distribución es un ave muy ligada a las masas forestales extensas y retiradas, con escasa presencia humana. Por esta razón la explotación forestal y la alteración del hábitat repercuten muy negativamente sobre la especie. En algunas zonas la excesiva presión cinegética es una amenaza para el mantenimiento de la población (2, 4)

## MEDIDAS DE CONSERVACION

En su área de distribución, conservación de los bosques donde habita y regulación de la actividad forestal. Restricción o suspensión de la caza en los núcleos más amenazados. Investigación y definición del estatus en los Pirineos.

## REFERENCIAS

- 1 . Elósegui, J. (1985): *Navarra. Atlas de las aves nidificantes*. Caja de Ahorros de Navarra, Pampiona.
2. Cramp, S., y Simmons, K. E.L. (1980): *The Birds of the Western Palearctic*. Vol. II Oxford University Press, Oxford.
3. Yeatman, L. (1976): *Atlas des oiseaux nicheurs de France de 1970 a 1975*. Ministère de la Qualité de la Vie.
4. De Franchesti, P. (1988): "La situazione attuale de Galliformi in Italia. Ricerche recenti o ancora in corso. Problemi di gestione e prospettive per il futuro". *Ric. Biologia della Selvaggine*, vol. XIX: 129-168.