

# Ovis musimon (Pallas, 1972)

(Aplicación del RD 630/2013 en Canarias)

## Especie Exótica Invasora

Mamíferos



**NOMBRE COMÚN:** Muflón.

**TAXONOMÍA:** Phylum: *Chordata*. Clase: *Mammalia*. Orden: *Artiodactyla*. Familia: *Bovidae*.

**DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA:** Europa.

### DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Mamífero herbívoro relativamente pequeño; su alzada a la cruz es de unos 75 cm, con una longitud total de cabeza y tronco entre los 120 y 140 cm, y un peso de 40 kg. El cuerpo es robusto, con largas y delgadas patas acabadas en unas pequeñas pezuñas. El pelaje es pardo-rojizo o chocolate, dependiendo de la estación, con el hocico, vientre y parte inferior de las patas de color blanco; la parte superior de las patas presenta pelos negros. Los machos son más robustos, con el pelo largo en el cuello, pecho y parte anterior de las patas, y lucen una característica mancha blanquecina en invierno (la "silla de montar") en el lateral del cuerpo; las hembras son más claras y no suelen tener la citada mancha. La cola es corta y negra, con el escudo anal blanco y bien marcado.

Tanto los machos como las hembras presentan cuernos sin ramificar, mucho más desarrollados en los machos, curvados hacia atrás en forma de espiral; los cuernos de las hembras son más pequeños, ligeramente curvados hacia atrás, y a veces carecen de ellos.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Cangrejo autóctono (*Austropotamobius pallipes*): pinzas rugosas con la cara venEs característica la mancha facial blanca, más grande cuanto más edad tiene el ejemplar, así como la gran cornamenta en espiral de los machos.

Las características más relevantes para diferencia a esta especie del género *Capra* son la cola, corta y negra en el caso del muflón y la ausencia de un mechón de pelos en la barbilla.

Puede generar confusión con el arruí (*Ammotragus lervia*), pero éstos son de color arena, y tienen una característica melena que se extiende desde la garganta hasta el pecho y las patas delanteras.

### NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

El muflón es herbívoro, consumiendo una amplia gama de materia vegetal. Habita zonas montañosas, tanto con pastos como con bosques o pedreros, pero se adapta fácilmente a distintos medios, prefiriendo las zonas de matorral y los roquedos. De hábitos gregarios, forman rebaños de machos, hembras y jóvenes.

**Impacto ecológico:** 1) Por su carácter herbívoro, amenaza a pequeñas plantas nativas, algunas de las cuales son endémicas o están amenazadas. 2) Puede provocar el desplazamiento de otros ungulados como la cabra montés. 3) El pisoteo y la alimentación sobre determinadas especies vegetales, puede contribuir a los fenómenos erosivos.

**PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA:** Introducido en Canarias para su aprovechamiento cinegético.

**PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN:** Una vez introducida, coloniza nuevas zonas de forma natural.

### PRINCIPALES FUENTES DE CONSULTA

- » Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras. Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (online, <http://www.magrama.gob.es/>)
- » Cassinello, J. (2003). Muflón – *Ovis orientalis*. En: Enciclopedia Virtual de los Vertebrados Españoles. Carrascal, L. M., Salvador, A. (Eds.). Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. <http://www.vertebradosibericos.org/>
- » Santiago Moreno J., A. Toledano Díaz, A. Gómez Brunet y A. López Sebastián (2004) El muflón europeo (*Ovis orientalis musimon* (Schreber, 1782) en España: consideraciones históricas, filogenéticas y fisiología reproductiva. *Galemys*, 16(2): 3-20.
- » <http://www.faunaiberica.org/?page=muflon>
- » <http://faunayfloradelosmontesdetoledo.blogspot.com.es/2007/04/muflon-ovis-musimon.html>

