



Foto: P. Navas


Armeria villosa subsp. carratracensis

Es un edafoendemismo exclusivo de las sierras peridotíticas malagueñas (sector Bermejense). La población más importante se ha detectado en la Sierra de Aguas en Carratraca (Málaga). Presenta un área muy restringida con pocas poblaciones generalmente con bajo número de individuos. Está muy influenciada por los incendios y el sobrepastoreo. La distribución real, muy restringida por la especificidad de su hábitat es inferior a los 3.5 km².

SITUACIÓN ACTUAL



SITUACIÓN FUTURA



Evolución prevista

Actualmente se presenta con poblaciones muy fragmentadas y aisladas con fuerte presión de herbívoros y afección por apertura de caminos y exceso de visitas y recolecciones. Aunque hay área potencial futura, ésta disminuye a fin de siglo y el riesgo de extinción es real si no se corrigen los problemas actuales.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 11 (3%)
- área potencial: 330

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	130 (39%)	766 (232%)	0%	100%
• 2041-2070	459 (139%)	488 (148%)	64%	100%
• 2071-2100	90 (27%)	35 (11%)	0%	9%
ECHAM4				
• 2011-2040	19 (6%)	0 (0%)	0%	0%
• 2041-2070	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%
• 2071-2100	0 (0%)	0 (0%)	0%	0%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.