



Foto: F. Martínez García

Buglossoides gastonii

Endémica del Pirineo occidental (España y Francia). En España se encuentra entre Lakartxela y el Ibón de Lacherito; sus poblaciones más numerosas se hallan en el karst de Larra-Mesa de los Tres Reyes (Alto Roncal, Navarra). Coloniza principalmente fisuras y rellanos sombríos de roquedos calizos, entre 1600 y 2350 m de altitud. En las siete poblaciones españolas apenas se han contado un centenar y medio de individuos.

SITUACIÓN ACTUAL



■ Presencia
■ Área potencial

SITUACIÓN FUTURA

■ CGCM2
■ ECHAM4
■ CGCM2 y ECHAM4

Evolución prevista

Se desconoce si existen amenazas externas sobre esta especie. El clima futuro no es limitante por lo que las acciones deben centrarse en las amenazas actuales in situ.

ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 7 (3%)
- área potencial: 218


	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	7439 (3412%)	5215 (2392%)	100%	100%
• 2041-2070	950 (436%)	3044 (1396%)	0%	100%
• 2071-2100	7335 (3365%)	7839 (3596%)	100%	100%
ECHAM4				
• 2011-2040	18147 (8324%)	11393 (5226%)	100%	100%
• 2041-2070	14 (6%)	6817 (3127%)	0%	0%
• 2071-2100	571 (262%)	2021 (927%)	0%	100%

VULNERABILIDAD




A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.