



Foto: G. Blanca

Bupleurum bourgaei

Especie localizada en la Sierra de Baza (Granada), Sierra del Pozo (Jaén), Padrón de Bienservida y Sierra de las Cabras (Albacete). Forma parte de sabinares y piornales en laderas pedregosas, sobre sustrato calizo. De distribución dispersa, muestra poblaciones con bajo número de individuos y muy afectadas por el ganado y los herbívoros silvestres. Se encuentra en franca regresión y sólo dos de las poblaciones cuentan con más de 1000 individuos. Aparece refugiada entre plantas espinosas o en lugares donde no llegan los herbívoros.

SITUACIÓN ACTUAL



■ Presencia
■ Área potencial

SITUACIÓN FUTURA

■ CGCM2
■ ECHAM4
■ CGCM2 y ECHAM4

Evolución prevista

La principal amenaza actual es el consumo directo por el ganado y las cabras monteses, de modo que solo se encuentra refugiado entre la vegetación espinosa. El riesgo climático no es alto pero debe ser protegida y reforzada en su área de distribución actual.


ESTADÍSTICA

Superficies actuales (km²)

- presencia: 7 (0%)
- área potencial: 1285

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
• 2011-2040	704 (55%)	1601 (125%)	29%	100%
• 2041-2070	2777 (216%)	1528 (119%)	100%	100%
• 2071-2100	241 (19%)	789 (61%)	0%	86%
ECHAM4				
• 2011-2040	1661 (129%)	56 (4%)	29%	0%
• 2041-2070	869 (68%)	31 (2%)	0%	0%
• 2071-2100	127 (10%)	5 (0%)	0%	0%

VULNERABILIDAD



A2

B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

**Medidas de adaptación.***In situ:*

- Protección de espacios actuales.
- Repoblación artificial en zonas vecinas.

Ex situ:

- Recolección de germoplasma y conservación en viveros.
- Traslocación de ejemplares a otras zonas potenciales lejanas.

Planificación y coordinación.

- Plan específico de conservación.
- Coordinación entre CC.AA.