




© MARIO G. PARÍS

Podarcis muralis

Podarcis muralis (Lagartija roquera). Extendida por el centro y sur de Europa. En la Península Ibérica ocupa la franja norte, los sistemas Central e Ibérico y, más puntualmente, algunas sierras levantinas. Está presente en gran variedad de medios, desde bosques caducifolios hasta construcciones humanas. SEl rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -14.8°C y 30.8°C, y el de precipitaciones entre 442 mm y 1873 mm anuales.

(Lagartija roquera)

SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,7587

SITUACIÓN FUTURA



Evolución Prevista:


Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos elevados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 93% y un 97% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 4% y un 8% en 2041-2070.

ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)

Presencia:	54200 (11%)	% Protegido actualmente:	(9%)
Área potencial:	122900	% Protegido futuro:	(0%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
2011-2040	106300 (-14%)	110400 (-10%)	(89%)	(90%)
2041-2070	53700 (-56%)	82100 (-33%)	(57%)	(77%)
2071-2100	28600 (-77%)	64700 (-47%)	(30%)	(64%)
ECHAM4				
2011-2040	35800 (-71%)	31300 (-75%)	(39%)	(36%)
2041-2070	3800 (-97%)	8000 (-93%)	(4%)	(8%)
2071-2100	0(-100%)	1200 (-99%)	(0%)	(2%)



MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Medidas para conservación ex situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.