




© FERNANDO ROMÃO

Psammodromus algirus

Psammodromus algirus (Lagartija colilarga). Se distribuye por el sudeste de Francia y el norte de África, así como por toda la Península Ibérica, con excepción de algunas zonas del noroeste y la franja cantábrica. Está presente desde el nivel del mar hasta 2400 m de altitud. Prefiere ambientes con amplia cobertura arbustiva, ocupando gran variedad de biotopos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -7.9°C y 36.7°C, y el de precipitaciones entre 214 mm y 1855 mm anuales.

(Lagartija colilarga)

SITUACIÓN ACTUAL



■ PRESENCIA
■ ÁREA POTENCIAL

TSS: 0,4398

SITUACIÓN FUTURA

■ ECHAM4
■ CGCM2
■ CGCM2 Y ECHAM4

Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos bajos en la distribución potencial. Los modelos proyectan aumentos en la distribución potencial actual de la especie entre un 16% y un 28% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 76% y un 81% en 2041-2070.


ESTADÍSTICAS

SUPERFICIES ACTUALES (KM2)


Presencia:	268900 (53%)	% Protegido actualmente:	(39%)
Área potencial:	325700	% Protegido futuro:	(36%)

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
CGCM2				
2011-2040	313200 (-4%)	287400 (-12%)	(75%)	(69%)
2041-2070	352200 (8%)	311200 (-4%)	(79%)	(72%)
2071-2100	274300 (-16%)	329300 (1%)	(58%)	(74%)
ECHAM4				
2011-2040	377500 (16%)	402300 (24%)	(81%)	(86%)
2041-2070	416500 (28%)	376500 (16%)	(81%)	(76%)
2071-2100	366400 (12%)	388900 (19%)	(74%)	(80%)



A2





B2



2011-2040



2041-2070



2071-2100

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- No se requieren medidas de adaptación.