



© RICARDO G. CALMAESTRA

# Saxicola rubetra


**Saxicola rubetra (Tarabilla norteña).** Se distribuye por la práctica totalidad de Europa, con excepción las áreas más meridionales. En la Península Ibérica ocupa el tercio norte, con un núcleo pirenaico y otro más cantábrico que penetra en la región mediterránea hasta el norte del Sistema Central. Prefiere biotopos abiertos con pastizales y arbustos dispersos. El rango de temperaturas de su distribución en la Península varía entre -10,3°C y 31,3°C, y el de precipitaciones entre 377 mm y 1656 mm anuales.

# (Tarabilla norteña)

ESTATUS ACTUAL

NO EVALUADA

## SITUACIÓN ACTUAL



TSS: 0,7632

## SITUACIÓN FUTURA



### Evolución Prevista:

Bajo los escenarios climáticos disponibles para el siglo XXI, se esperan impactos elevados en la distribución potencial. Los modelos proyectan contracciones en la distribución potencial actual de la especie entre un 98% y un 99% en 2041-2070 y el nivel de coincidencia entre la distribución observada y potencial se reduce hasta un rango de entre un 2% y un 5% en 2041-2070.

## ESTADÍSTICAS

### SUPERFICIES ACTUALES (KM2)


Presencia:	33100	(7%)	% Protegido actualmente:	(5%)
Área potencial:	112900		% Protegido futuro:	(0%)

### APF


### OPF

	APF		OPF	
	A2	B2	A2	B2
<b>CGCM2</b>				
2011-2040	86000 (-24%)	96700 (-14%)	(77%)	(82%)
2041-2070	32300 (-71%)	51100 (-55%)	(32%)	(49%)
2071-2100	6700 (-94%)	37900 (-66%)	(10%)	(39%)
<b>ECHAM4</b>				
2011-2040	8300 (-93%)	7700 (-93%)	(13%)	(12%)
2041-2070	800 (-99%)	2100 (-98%)	(2%)	(5%)
2071-2100	0(-100%)	500(-100%)	(0%)	(2%)

## A2






## B2



2011-2040

2041-2070

2071-2100



### MEDIDAS DE ADAPTACIÓN

- Protección jurídica.
- Medidas para conservación in situ.
- Medidas para conservación ex situ.
- Acciones para favorecer permeabilidad y conectividad.